





3

# أستعد لاجتياز الامتحان الجاهزي في الرياضيات



$$\begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{3}y = 6 \\ 3x + 4y = 0 \end{cases}$$



مواقع وحلول امتحانات جهوية

من إعداد:

عمر بن إيكو

أستاذ مادة الرياضيات


إعدادية تودغى العليا

نيابة تنغير



## يحتوي هذا المطبوع على:

- تذكير بأهداف كل درس من دروس الأسدوس الثاني وأهم الخصائص.
- تذكير بأهم العلاقات والتعريفات والقواعد.
- الامتحان الجهوي الموحد لجهة سوس ماسة درعة دورة يونيو 2006 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد لجهة سوس ماسة درعة دورة يونيو 2008 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد لجهة سوس ماسة درعة دورة يونيو 2009 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد لجهة سوس ماسة درعة دورة يونيو 2010 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد لجهة مكناس تافيلالت دورة يونيو 2009 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد لجهة دكالة عبدة دورة يونيو 2007 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد لجهة الرباط سلا زمور زعير دورة يونيو 2010 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد للجهة الشرقية دورة يونيو 2009 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد للجهة كلميم السمارة دورة يونيو 2010 "الموضوع + الحل"
- الامتحان الجهوي الموحد للجهة الشرقية - وجدة دورة يونيو 2007 "الموضوع"



## عنوان الدرس

المعادلات والمترابحات

المتجهات والإزاحة

## التعلميات المستهدفة

- حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد بتوظيف تقنيات الحساب العددي.
- اكتساب منهجة ترتيب وضعيات وحل المسائل باستعمال المعادلة.
- تأويل النتائج.
- حل مترابحة باستعمال تقنيات الحساب العددي والترتيب.
- حل مسائل باستعمال المترابحات.
- تمثيل الحلول وتأويل النتائج.

## تعريف و خاصيات وقواعد

- إذا أضفنا إلى طرفي متساوية نفس العدد نحصل على متساوي آخر.
- إذا طرحنا من طرفي متساوية نفس العدد نحصل على متساوي آخر.
- إذا ضربنا طرفي متساوية في نفس العدد نحصل على متساوية أخرى.
- حلول المعادلة  $(ax+b)(cx+d) = 0$  هي حلول المعادلتين:  

$$ax + b = 0 \quad \text{and} \quad cx + d = 0$$

ل يكن  $a$  و  $b$  و  $c$  و  $d$  أعداد حقيقة:  

$$a \leq b \quad \text{يعني أن } a+c \leq b+c$$

$$\text{ل يكن } a \text{ و } b \text{ و } k \text{ أعداد حقيقة.}$$

$$\text{إذا كان } (ka \leq kb \text{ و } a \leq b) \text{ فـان: } k > 0$$

$$\text{إذا كان } (ka \geq kb \text{ و } a \leq b) \text{ فـان: } k < 0$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \quad \text{يعني أن } (AB) \parallel (CD) \quad -$$

$$\overrightarrow{CD} \text{ و } \overrightarrow{AB} \text{ لها نفس الاتجاه:}$$

$$\overrightarrow{CD} \text{ و } \overrightarrow{AB} \text{ لها نفس المنحى.}$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \quad \text{و } \overrightarrow{CD} \text{ لها نفس المنظم: } \overrightarrow{AC} = \alpha \overrightarrow{AB} \quad -$$

$C$  نقطة من المستقيم  $(AB)$

$$\overrightarrow{AC} = \alpha \overrightarrow{AB} \quad -$$

$$\overrightarrow{AC} \text{ و } \overrightarrow{AB} \text{ لها نفس المنحى}$$

$$AC = \alpha AB \quad (\alpha > 0)$$

$$\overrightarrow{AC} = -\alpha \overrightarrow{AB} \quad -$$

$$\overrightarrow{AC} \text{ و } \overrightarrow{AB} \text{ لها منحى عكسيان}$$

$$(\alpha < 0)$$

▪ لتكن  $A$  و  $B$  و  $C$  ثلاث نقاط من المستوى،  $k$  عدد حقيقي غير منعدم.

إذا كان  $\overrightarrow{AB} = k \overrightarrow{AC}$  فإن النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  مستقيمية.

▪ لتكن  $A$  و  $C$  و  $B$  و  $D$  نقاط من المستوى،  $k$  عدد حقيقي غير منعدم.

إذا كان  $\overrightarrow{AB} = k \overrightarrow{CD}$  فإن المستقيمين  $(AB)$  و  $(DC)$  متوازيان.

$$\alpha(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}) = \alpha \overrightarrow{AB} + \alpha \overrightarrow{CD} \quad -$$

$$\alpha(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}) = \alpha \overrightarrow{AB} - \alpha \overrightarrow{CD} \quad -$$

$$\alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{AB} \quad -$$

$$-\alpha \overrightarrow{AB} = \alpha \overrightarrow{BA} \quad -$$

▪  $M'$  هي صورة  $M$  بالإزاحة التي تحول  $A$  إلى  $B$

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB} \quad -$$

▪ يعني أن

▪ إذا كانت  $M'$  و  $N'$  صورتي  $M$  و  $N$  على التوالي بالإزاحة ذات متجهة  $\overrightarrow{u}$  فإن

$$\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN} \quad -$$

▪ صورة مستقيم بازاحة هو مستقيم يوازيه.

▪ صورة زاوية بازاحة هي زاوية تقابيسها.

▪ صورة دائرة بازاحة هي دائرة لها نفس الشعاع.

▪ تحديد إحداثي متجهة.

▪ تحديد إحداثي منتصف قطعة.

▪ تحديد إحداثي مجموع متجهتين.

▪ تحديد المسافة بين نقطتين معرفتين بإحداثياتهما.

$B(x_B; y_B)$  و  $A(x_A; y_A)$  نقطتان من مستوى منسوب إلى معلم متعمد،  $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$

$$\begin{cases} x_B - x_A = x_F - x_E \\ y_B - y_A = y_F - y_E \end{cases} \text{ يعني أن: } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$$

.  $\overrightarrow{CD}(c, d)$  و  $\overrightarrow{AB}(a, b)$

. إذا كان  $\overrightarrow{EF}(a+c; b+d)$  فإن:  $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$  فإذا كان  $k$  عدد حقيقي.

. إذا كان  $\overrightarrow{EF}(ka, kb)$  فإن:  $\overrightarrow{EF} = k\overrightarrow{AB}$

▪ إذا كان  $B(x_B; y_B)$  و  $A(x_A; y_A)$  نقطتين من مستوى منسوب إلى معلم متعمد منظم.

- إذا كان  $M$  منتصف قطعة  $[AB]$

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right) \text{ فإن:}$$

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2} \text{ و}$$

(Δ) مستقيم لا يوازي محور الأرتب.

▪ إذا كان  $y = mx + p$  (Δ)،  $m$  يسمى المعامل الموجه للمستقيم أو ميل المستقيم (Δ)، و  $p$  يسمى الأرتوب عند الأصل.  $y = mx + p$  هي العلاقة التي تجمع بين أرتوب ( $y$ ) وأفصول ( $x$ ) كل نقطة من المستقيم (Δ).

▪ إذا كانت  $B(x_B, y_B)$  و  $A(x_A, y_A)$  نقطتين مختلفتين من المستقيم (Δ) الذي معادلته:  $y = mx + p$  فإن:

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \text{ مع العلم أن: } x_B \neq x_A$$

-  $m$  هو أرتوي نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع محور الأرتب.

يكون مستقيمان متوازيين، إذا كان لهما نفس الميل.

▪ إذا كان لمستقيمين نفس الميل، فهما متوازيان.

▪ يكون مستقيمان متعمدين، إذا كان جداء ميليهما يساوي 1.

▪ إذا كان جداء ميلي مستقيمين يساوي 1 – فإنهم متعمدين.

▪ **الحل بطريقة التعويض** من إحدى المعادلتين، نجد قيمة أحد المجهولين بدلاًة الآخر، ثم نوضعه في المعادلة الأخرى.

▪ **الحل بطريقة التالية الخطية**

لكي نحتفظ بأحد المجهولين (لكي نتمكن من حساب قيمته) نضرب كل معادلة من معادلتي النظمة في معامل مناسب لحصول على معاملين متقابلين بالنسبة للمجهول الآخر ثم نجمع المعادلتين المحصل عليهما طرفاً بطرف.

▪ **الحل الهندسي**

كل معادلة من النظمة مرتبطة بمستقيم.

▪ إذا تقاطع المستقيمين في نقطة  $M(x, y)$  فإن حل النظمة هو

$$(x, y)$$

- تعرف أن المستقيم مكون من جميع النقاط  $(x; y)$  التي تحقق  $y = ax + b$ .
- كتابة معادلة مختصرة لمستقيم من نقطتين.
- تمثيل مستقيم باستعمال المعادلة المختصرة.
- استعمال المعامل الموجه في التعرف على توازي وتعامد مستقيمين.

- تعرف وحل النظمات من معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين باستعمال تقنية التعويض أو التأليفات الخطية.
- التأويل الهندسي لحل النظمة بربطها بمعادلتين لمستقيمين متوازيين أو متقطعين.
- توظيف حل النظمات في معالجة بعض المسائل.

- إذا كانت  $f$  دالة خطية و  $x$  عدداً حقيقياً غير منعدم، فإن  $\frac{f(x)}{x}$  هو معامل الدالة  $f$ .
- في معلم  $(O, I, J)$ ، التمثيل المباني لدالة خطية  $f$  هو مستقيم يمر من أصل المعلم  $O$  ونقطة  $M(x, f(x))$ .
- $(x, y)$  تتنمي إلى التمثيل المباني لدالة خطية  $f$  تعني:  $f(x) = y$ .
- إذا كانت  $f$  دالة تألفية و  $x$  و  $x'$  عددين حقيقين مختلفين. فإن  $\frac{f(x) - f(x')}{x - x'}$  هو معامل الدالة  $f$ .
- في معلم  $(O, I, J)$ ، التمثيل المباني لدالة تألفية هو مستقيم يمر من النقطة  $M(x, f(x))$ .
- $(x, y)$  تتنمي إلى التمثيل المباني لدالة تألفية  $f$  تعني أن  $f(x) = y$ .

المعدل الحسابي أو القيمة المتوسطة لمتسسلة إحصائية هو خارج مجموع جداءات قيم الميزة والخصائص الموافقة لها على الحصيص الإجمالي.

في متسسلة إحصائية بحيث قيم ميزتها مرتبة تزايدياً، القيمة الوسطية هي قيمة الميزة التي تقسّم هذه المتسسلة الإحصائية إلى جزأين متساوين.

منوال متسسلة إحصائية هو قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص.

- يكون مستقيم  $D$  عمودي على مستوى  $(P)$  في نقطة  $A$  إذا كان عمودياً في النقطة  $A$  على مستقمين من  $(P)$  متقاطعين في  $A$ .
- مستويان متوازيان يحددان مع مستوى يقطعهما مستقмиان متوازيان.
- إذا كان مستقيم  $D$  عمودي على مستوى  $(P)$ ، فإن  $D$  عمودي على جميع المستقيمات الموجودة ضمن  $(P)$ .
- إذا كانت  $S$  هي مساحة مجسم قبل تكبير أو تصغير نسبته  $k$  و  $S'$  مساحته بعد التكبير أو التصغير فإن:  $S' = k^2 S$ .
- إذا كان  $V$  هو حجم مجسم قبل تكبير أو تصغير نسبته  $k$  و  $V'$  حجمه بعد التكبير أو التصغير فإن:  $V' = k^3 V$ .

- التعرف على الكتابة:  $ax \mapsto x$  و  $y = f(x)$  واستعمال الكتابة:  $ax + b$
- إنشاء وتلويل التمثيل المباني لدالة خطية ودالة تألفية.
- التعامل مع المبيان وقراءة صورة عدد وتحديد عدد صورته معلومة من خلال التمثيل المباني لدالة خطية أو دالة تألفية.

- تعرف وسيطات الوضع لمتسسلة إحصائية: المعدل الحسابي - القيمة الوسطية - المنوال.
- التمييز بين المعدل الحسابي والقيمة الوسطية واستعمالها في تأويل نتائج دراسة إحصائية وتحديد بياناتها.
- تعرف مفهوم التشتت بمقارنة جدولين أو تمثيلين لمتسسلة إحصائية.

- التعرف على حجوم المجرميات الاعتيادية التالية: متوازي المستويات، المكعب، الهرم المنتظم، الأسطوانة القائمة.
- تطبيق مبرهنة فيتاغورس لحساب بعض الأطوال والحجوم في المجرميات الاعتيادية.
- تطبيق مبرهنة طاليس لحساب بعض الأطوال والحجوم في المجرميات الاعتيادية.
- التعرف على أثر تكبير أو تصغير على الأطوال والمساحات والحجوم.
- استعمال تكبير وتصغير الأشكال في حل مسائل.

## الحساب الجبري

النشر: من اليسار إلى اليمين والتعميل من اليمين إلى اليسار

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

### المتطابقات الهامة

$$\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$$

$$\sqrt{x \times y} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$$

$$\begin{aligned} (\sqrt{x})^2 &= \sqrt{x} \times \sqrt{x} = x \\ \sqrt{x^2} &= \sqrt{x \times x} = x \end{aligned}$$

**الجذور المربعة**  
( $y > 0$  و  $x > 0$ )

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

$$(a \times b)^m = a^m \times b^m$$

$$\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$$

$$\begin{aligned} a^m \times a^p &= a^{m+p} \\ (a^m)^p &= a^{m \times p} \end{aligned}$$

**القوى**  
( $a$  و  $b$  غير منعدمين،  $m$  و  $p$  صحيحان طبيعيان)

كتابة عدد على شكل  $a \times 10^n$  حيث  $1 \leq a < 10$  و  $n$  عدد صحيح نسبي

### الكتابة العلمية

## مبرهنة طاليس

### مبرهنة طاليس العكسية


المستقيمين  $(BM)$  و  $(CN)$  يتقاطعان في نقطة  $A$ .

إذا كانت النقط  $A$  و  $B$  و  $M$  والنقط  $A$  و  $C$  و  $N$  في نفس الترتيب و  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$  ، فإن  $(MN) // (BC)$  متوازيان.

### مبرهنة طاليس المباشرة

إذا كان مستقيمين  $(BM)$  و  $(CN)$  يتقاطعان في نقطة  $A$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \text{ بحيث: } (MN) // (BC).$$



## مبرهنة فيتاغورس

### استعمال مبرهنة فيتاغورس العكسية

ليكن  $ABC$  مثلث قائم الزاوية في  $A$  ، بحيث  $AB = 2\sqrt{3}$  و  $BC = 6$  .

### استعمال مبرهنة فيتاغورس المباشرة

لابد حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:  $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$$RS^2 = (4\sqrt{6})^2 = 16 \times 6 = 96 \quad \text{لدينا:}$$

$$ST^2 + RT^2 = 21 + 25 \times 3 = 96 \quad \text{و} \quad ST^2 + RT^2 = RS^2 \quad \text{لابد}$$

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس العكسية فإن المثلث  $RST$  قائم الزاوية في  $T$ .

$$6^2 = (2\sqrt{3})^2 + AC^2 \quad \text{لابد:}$$

$$AC^2 = 36 - 4 \times 3 = 24 \quad \text{لابد:}$$

$$AC = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \quad \text{المسافة } AC \text{ موجبة لابد:}$$

## الإحصاء


**المنوال:** قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص.

**التردد:** **الحصص الإجمالي**

**القيمة الوسطية:** قيمة الميزة التي تقسم المتسلسلة الإحصائية إلى جزأين متساوين. (قيم الميزة مرتبة ترتيباً تزايدياً) وهي كذلك أصغر قيم الميزة التي حصصها المترافق أكبر أو يساوي نصف الحصص الإجمالي.

## الدالة الخطية والدالة التالية

التمثيل البياني عبارة عن مستقيم، معامله الموجه هو  $a$  و  $b$  الأرتبوب عند الأصل. (بالنسبة للدالة الخطية، المستقيم يمر من أصل المعلم.)



### الدالة الخطية

$$f : x \mapsto ax \quad \text{أو} \quad f(x) = ax$$


### الدالة التالية

$$f : x \mapsto ax + b \quad \text{أو} \quad f(x) = ax + b$$

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

لكل عددين  $x_1$  و  $x_2$

## الحساب المثلثي



$$\cos \alpha = \frac{\text{المحادي}}{\text{الوتر}}$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{المقابل}}{\text{المحادي}}$$

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\alpha \neq 90^\circ)$$

## إحداثيات

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad AB(x_B - x_A, y_B - y_A)$$

$$ku(k\alpha) \text{ و } \bar{u}(k\beta) \quad \text{إذن: } \bar{u}(\alpha + \lambda) \text{ و } \bar{v}(\beta + \rho) \quad \bar{v}(\lambda) \text{ و } \bar{u}(\beta)$$

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right) \quad [AB] \text{ منتصف } M$$


## التوازي في الفضاء

### خاصية:

كل مستويين متوازيان يحددان مع مستوى يقطعهما مستقيمين متوازيين.

### في الشكل جانبه:

إذا كان المستويان  $(P)$  و  $(Q)$  متوازيين فإن المستقيمين  $(AB)$  و  $(CD)$  متوازيان.



## التعامد في الفضاء

### مبرهنة:

لكي يكون المستقيم  $(\Delta)$  عمودي على المستوى  $(P)$  في النقطة  $A$  يكفي أن يكون عمودياً في هذه النقطة على مستقيمين من  $(P)$  متقاطعين في  $A$ .

### في الشكل جانبه:

المستقيم  $(\Delta)$  عمودي على المستوى  $(P)$ . لأنه يوجد مستقيمين  $(D_1)$  و  $(D_2)$  ضمن المستوى  $(P)$  بحيث  $(\Delta)$  عمودي عليهما.


### باستعمال الرموز:

$$\left. \begin{cases} (\Delta) \perp (D_1) \\ (\Delta) \perp (D_2) \end{cases} \right\} \text{إذا كان}$$

$$\left. \begin{cases} (D_1) \subset (P) \\ (D_2) \subset (P) \end{cases} \right\} \text{و}$$

و  $(D_1)$  و  $(D_2)$  يتقاطعان في النقطة  $A$

فإن:  $(\Delta)$  عمودي على المستوى  $(P)$  في النقطة  $A$ .



## حروف ورموز

Delta :  $\Delta$   
delta :  $\delta$

alpha :  $\alpha$   
beta :  $\beta$

$\cap$ : تقاطع  
 $\cup$ : اتحاد


$\subset$ : ضمن  
 $\not\subset$ : ليس ضمن

$\in$ : ينتمي إلى  
 $\notin$ : لا ينتمي إلى

$\perp$ : عمودي على  
 $//$ : يوازي

## حساب الحجوم

الحجم،  $V$  : المساحة الكلية : المساحة القاعدة،  $B$




مجسم أوجهه الجانبية مستطيلات وقاعدته مقلعان متقابسان.

الموشور القائم

$$V = B \times h$$

$$S = 2B + ph$$




موشور قائم قاعدته مستطيلان (متقابسان).

متوازي المستطيلات

$$V = abc$$

$$S = 2(ab + bc + ca)$$




موشور قائم كل وجه من أوجهه عبارة عن مربع.

المكعب

$$V = a^3$$


$$S = 6a^2$$



مجسم أوجهه الجانبية مثلثات لها رأس مشترك وقاعدته مقلع.

الهرم


$$V = \frac{Bh}{3}$$



مجسم دوراني "يولده" دوران مستقيم حول مستقيم يوازيه، قاعدته قرصان متقابسان.

الأسطوانة القائمة

$$V = B \times h$$



السطح الجانبي "بعد النشر" عبارة عن مستطيل.

$$V = \pi r^2 \times h$$

$$A = 2\pi r \times h$$

الموضوعالتمرين الخامس:

يتكون ناد من 20 فرداً أعمارهم كالتالي:  
 $22 - 17 - 38 - 30 - 18 - 24 - 22 - 28 - 30 - 18 - 24 - 22 - 28 - 30 - 18 - 24 - 29 - 18 - 24 -$   
 1. أعط جدول الحصصيات.


2. بين أن المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية هو 25.
3. التحق مؤخراً منخرط جديد بالنادي. حدد سن هذا المنخرط إذا علمت أن المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية لم يتغير.

التمرين السادس:

هرم منتظم قاعدته المربع  $ABCD$  الذي مركزه  $O$ .

$$SA = SB = SC = SD = 5 \quad AB = 3\sqrt{2}$$

1. بين أن الارتفاع  $SO$  يساوي 4.
  2. لتكن ' $A'$  و ' $B'$  و ' $C'$  و ' $D'$  منتصفات القطع  $[SA]$  و  $[SB]$  و  $[SC]$  و  $[SD]$  على التوالي.
- أحسب حجم المجسم ' $.ABCDA'B'C'D'$ '.

التمرين الأول:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ 4x + y = 15 \end{cases}$$

حل جبرياً النقطة التالية:

التمرين الثاني:

نعتبر الدالة التالية  $f(x) = 3x - 2$  بحيث:

.1

أ. أحسب  $f(1)$ .

ب. هل النقطتين  $(0; 2)$  و  $B\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right)$  تنتهيان إلى  $(\Delta)$ ؟

التمثيل المباني لـ  $f$ .

ج. أنشئ  $(\Delta)$  في معلم معتمد منظم  $(O, I, J)$ .

2.  $g$  دالة خطية تمثلها المباني يقطع  $(\Delta)$  في  $B$ .

أ. مثل مبانيا  $g$  في نفس المعلم  $(O, I, J)$ .

ب. حدد صيغة  $g$ .

التمرين الثالث:

لتكن  $(-1; 3)$  و  $(2; 4)$  و  $(-2; 4)$  ثلاًث نقط في معلم معتمد منظم  $(O, I, J)$ .

1. أحسب إحداثي المتجهة  $\overrightarrow{AB}$  والمسافة  $.AB$ .


2. حدد إحداثي النقطة  $P$  منتصف  $[AB]$ .

3. تحقق أن  $CP = \frac{5\sqrt{2}}{2}$  واستنتج طبيعة المثلث  $ABC$ .

التمرين الرابع:

1. مثلث قائم الزاوية في  $ABC$  بحيث  $AB = 2$  و  $BC = 4$ .  
 ليكن  $I$  منتصف  $[BC]$  و  $t$  الإزاحة التي متوجهها  $\overrightarrow{AI}$ .

- أ. ما هي صورة  $A$  بالإزاحة  $t$ ؟
- ب. أنشئ  $D$  صورة  $A$  بالإزاحة  $t$ .
2. بين أن المثلث  $BDI$  متساوي الأضلاع.

الحل

. ج.

$$\begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ 4x + y = 15 \end{cases}$$

لدينا:

بتطبيق طريقة التالية الخطية وذلك بضرب المعادلة الأولى في 2 -

$$\begin{cases} -4x + 6y = -22 \\ 4x + y = 15 \end{cases}$$

نحصل على النقطة: نعرض المعادلة الثانية بمجموع المعادلتين الأولى والثانية طرفا بطرف

$$\begin{cases} -4x + 6y = -22 \\ 7y = -7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4x + 6y = -22 \\ y = -1 \end{cases}$$

أي أن

نعرض  $y = -1$  في المعادلة الأولى نحصل على المعادلة:

$$-4x - 6 = -22$$

بحل هذه المعادلة نجد أن  $x = 4$ .إذن الزوج  $(-4; -1)$  هو حل النقطة.التمرين الثاني:

$$f(x) = 3x - 2$$

لدينا:

$$f(1) = 3 \times 1 - 2 = 1$$

أ.

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2} \quad f(0) = -2$$

فإن النقطة  $A(0; 2)$  لا تنتمي إلى  $(\Delta)$  و النقطة

$$B\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

التمرين الثالث:

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

$$\overrightarrow{AB}(5; -5)$$

إذن:

$$AB = \sqrt{5^2 + (-5)^2}$$

ومنه:

$$AB = 5\sqrt{2}$$

إذن:

التمرين الخامس:

.1

العمر	عدد الأفراد
38	1
37	3
30	1
29	2
28	4
24	3
22	3
18	3
17	2
الإجمالي	1

2. ليكن  $M$  المعدل الحسابي للمتسلسلة.

$$M = \frac{2 \times 17 + 3 \times 18 + 3 \times 22 + 4 \times 24 + 2 \times 28 + 1 \times 29 + 3 \times 30 + 1 \times 37 + 1 \times 38}{20}$$

$$= \frac{500}{20}$$

$$= 25$$


3. ليكن  $x$  هو عمر المنخرط الجديد

$$M = \frac{500 + x \times 1}{21} = 25 \quad \text{إذن:}$$

$$\frac{x}{21} = 25 - \frac{500}{21} \quad \text{أي:}$$

$$\frac{x}{21} = \frac{25}{21} \quad \text{يعني أن:}$$

$$x = 25 \quad \text{ومنه:}$$

التمرين السادس:1. هرم منتظم، أي ( $SO$ ) عمودي على المستوىفي  $O$ ، يعني أن المثلث  $SOB$  قائم الزاوية في $O$ .

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:

$$SO^2 + OB^2 = SB^2$$

$$SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} \quad \text{أي}$$

لدينا  $ABCD$  مربع يعني أن المثلث  $ABD$  قائم الزاوية في

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:


$$2AB^2 = BD^2$$

.2. لدينا  $P\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$   
إذن:  $P\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$

.3. لدينا  $P\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$  و  $C(2; 4)$   
إذن:  $CP = \sqrt{\left(\frac{3}{2} - 2\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - 4\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{-7}{2}\right)^2}$   
 $= \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{49}{4}} = \sqrt{\frac{50}{4}} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{4}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$

الاستنتاج:نلاحظ أن:  $PA = PB = PC$ إذن: النقطة  $P$  منتصف  $[AB]$  ومتساوية المسافة عن  $A$  و  $B$  و  $C$ ومنه فإن المثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $C$ .التمرين الرابع:

.1

أ. بما أن  $t$  هي الإزاحة التي منجهتها  $\overrightarrow{AI}$  فإن  $t$  تحول  $A$  إلى  $I$ . إذن صورة  $A$  بالإزاحة  $t$  هي  $I$ .ب. لدينا  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AI}$  يعني أن:  $t_{\overrightarrow{AI}}(B) = D$ إذن  $D$  الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع  $IABD$ 2. المثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $A$  بما أن  $I$  منتصف الوتر

$$BI = AI \quad \text{و} \quad AI = \frac{1}{2} BC \quad \text{فإن } [BC]$$

- بما أن  $BC = 4$  إذن:  $2$ 

$$(1) \quad BI = 2 \quad \text{ومنه:}$$

بما أن الرباعي  $ABDI$  متوازي الأضلاع.إذن:  $DI = AB$  و  $BD = AI$ 

$$(2) \quad DI = 2 \quad \text{بما أن } AB = 2 \quad \text{إذن:}$$

$$(3) \quad BD = 2 \quad \text{بما أن } AI = 2 \quad \text{إذن:}$$

من (1) و (2) و (3) نستنتج أن المثلث  $BDI$  متساوي الأضلاع.

$$V_{ABCD A'B'C'D'} = V - \left(\frac{1}{2}\right)^3 V \quad \text{إذن:}$$

فإن

$$V = \frac{1}{3} SO \times AB^2 = 24 \quad \text{بما أن}$$

$$V_{ABCD A'B'C'D'} = V - \frac{1}{8} V = V \left(1 - \frac{1}{8}\right) = \frac{7}{8} V$$

$$= \frac{7}{8} \times 24 = 21$$

أي:

$$BD = \sqrt{2} AB = 3 (\sqrt{2})^2 = 6$$


يعني أن:

$$OB = \frac{1}{2} BD = 3$$


وبالتالي:

$$SO = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

.2



نعتبر المستوى  $(SAB)$



في المثلث  $SAB$  بما أن  $A'$  و  $B'$  منتصف الضلعين  $[SA]$  و

$$\frac{SA'}{SA} = \frac{SB'}{SB} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{1}{2} \quad \text{فإن } [SB] \quad \text{بنفس الطريقة نبين أن}$$

$$\frac{SD'}{SD} = \frac{SC'}{SC} = \frac{D'C'}{DC} = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad \frac{SA'}{SA} = \frac{SD'}{SD} = \frac{A'D'}{AD} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{SC'}{SC} = \frac{SB'}{SB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{1}{2} \quad \text{و}$$

إذن:

$$\frac{SA'}{SA} = \frac{SD'}{SD} = \frac{SC'}{SC} = \frac{SB'}{SB} = \frac{A'D'}{AD} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{C'D'}{CD} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{1}{2}$$

ومنه فإن الهرم  $SA'B'C'D'$  تصغير للهرم  $SABCD$  بنسبة  $\frac{1}{2}$ .

حيث  $V$  هو حجم الهرم  $SABCD$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \times V \quad \text{و} \quad SA'B'C'D' \quad \text{هي}$$

الموضوعالتمرين الرابع:

نعتبر في معلم متعامد ومنتظم  $(O, I, J, K)$  المستقيمين

$$(D'): y = \frac{-1}{3}x \quad (D): y = 3x - 1$$

1. بين أن  $(D)$  و  $(D')$  متعامدين.

2. حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(\Delta)$  الموازي للمستقيم  $A(2; -3)$  والمار من النقطة

التمرين الخامس:

نعتبر في معلم متعامد ومنتظم  $(O, I, J, K)$  النقط  $E(6; 3)$  ،

$F(2; 5)$  و  $G(-3; 2)$  والدائرة  $(C)$  التي أحد أقطارها

$[EG]$

1. مثل النقط  $E$  ،  $F$  و  $G$ .

2. حدد إحداثي النقطة  $H$  مركز الدائرة  $(C)$ .

3. أحسب شعاع الدائرة  $(C)$ .

4. نعتبر الإزاحة  $T$  التي تحول  $E$  إلى  $F$  و  $(C)$  صورة الدائرة  $(C)$  بالإزاحة  $T$ .


أ. حدد شعاع  $(C')$ .

ب. حدد إحداثي  $H'$  مركز  $(C')$  ثم أنشئها.

التمرين السادس:

نادي للسباحة  $ABCDEFGH$  متوازي مستطيلات بحيث  $ABCD$  مربع و

$.BF = 3cm$  و  $AB = 4cm$



1.

أ. أحسب  $CH$ .

ب. أحسب حجم الهرم  $HABD$ .

2.  $HA'B'C'D'$  هو تكبير الهرم  $HABD$  بحيث مساحة

المربع  $A'B'C'D'$  تساوي  $48cm^2$ . أحسب معامل التكبير  $k$ .

التمرين الأول:

.1

$$\frac{2x}{3} - \frac{5}{6} = x - \frac{3}{2}$$

أ. حل المعادلة التالية:

ب. حل المتراجحة :

.2

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ x + y = 20 \end{cases} : \quad \text{أ. حل النظمة}$$

ب. واجب زيارة أحد المتاحف هو 3 دراهم للأطفال و 5 دراهم للكبار.

أدى فوج يتكون من 20 زائر مبلغ 72 درهماً لزيارة هذا المتحف.

حدد عدد الأطفال وعدد الكبار في هذا الفوج.

التمرين الثاني:

1. لتكن  $f$  دالة خطية بحيث:

أ. حدد معامل الدالة  $f$ .

ب. أحسب  $f(-3)$ .

ج. حدد العدد الذي صورته  $\frac{-3}{5}$  بالدالة  $f$ .

2. نعتبر الدالة التالية  $g$  بحيث

أ. أحسب  $g(-1)$  و  $g(0)$ .

ب. أنشئ التمثيل المباني للدالة  $g$  في معلم متعامد ومنتظم  $(O, I, J)$ .

التمرين الثالث:

يضم نادي للسباحة 25 منخرطاً موزعين حسب أعمارهم وفق الجدول التالي:

العمر (سنة)	17	16	15	14	13	12	
الحصيص	4	8	1	7	3	2	
الحصيص التراكم							

1. أتمم الجدول وحدد المنوال؟

2. ما هو العمر المتوسط للمنخرطين؟

3. أحسب القيمة الوسطية؟

الحل

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ x + y = 20 \end{cases}$$

نحصل على النظمة

حل هذه النظمة هو الزوج (14; 7) (السؤال أ)  
يتكون الو夫د من 14 طفل و 7 كبار.

التمرين الثاني:

.1

أ.  $f(x) = ax$  دالة خطية يعني أن  $f$  تكتب على شكل  $f$ .

$$a = \frac{3}{2} \quad \text{بما أن } 3 = a \times 2 \quad \text{فإن: } a = \frac{3}{2}$$

إذن معامل الدالة  $f$  هو  $\frac{3}{2}$ .

$$f(-3) = \frac{3}{2} \times (-3) \quad \text{لدينا} \quad f(x) = \frac{3}{2}x$$

$$f(-3) = \frac{-9}{2} \quad \text{إذن}$$

ج. ليكن  $b$  العدد الحقيقي الذي صورته بالدالة  $f$  هو  $\frac{-3}{5}$ .

$$\frac{3}{2} \times b = \frac{-3}{5} \quad \text{يعني أن} \quad f(b) = \frac{-3}{5}$$

بحل هذه المعادلة نجد أن  $b = \frac{-2}{5}$ .

إذن  $\frac{-2}{5}$  هو العدد الحقيقي الذي صورته بالدالة  $f$  هي

$$g(x) = 2x + 3 \quad .2$$

$$g(0) = 2 \times 0 + 3 = 3$$

$$g(0) = 3$$

$$\left| \begin{array}{l} g(-1) = 2 \times (-1) + 3 \\ \quad = -2 + 3 \\ \quad = 1 \end{array} \right. \quad \text{إذن} \quad \left| \begin{array}{l} g(-1) = 1 \end{array} \right. \quad \text{إذن}$$

التمرين الأول:

.1

أ. حل المعادلة:

$$\frac{2x}{3} - \frac{5}{6} = x - \frac{3}{2}$$

$$6 \times \left( \frac{2x}{3} - \frac{5}{6} \right) = 6 \times \left( x - \frac{3}{2} \right)$$

يعني أن

$$4x - 5 = 6x - 9$$

يعني أن

$$-2x = -4$$

يعني أن

$$x = 2$$

يعني أن

إذن حل المعادلة المقترحة هو .2

ب. حل المترابحة:

$$2 - 3x > x + 7$$

يعني أن

$$-x - 3x > 7 - 2$$

يعني أن

$$-4x > 5$$

يعني أن

$$x < \frac{5}{-4}$$

يعني أن

$$x < \frac{-5}{4}$$

يعني أن

إذن جميع الأعداد الحقيقة الأصغر قطعاً من  $\frac{-5}{4}$  حلول للمترابحة المقترحة.

.2

أ.

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 & (1) \\ x + y = 20 & (2) \end{cases}$$

لنحل هذه النظمة بطريقة التعويض.

$$x + y = 20$$

لدينا (2) من المعادلة

$$y = 20 - x$$

إذن

ننوه  $y = 20 - x$  في المعادلة (1)نحصل على المعادلة  $3x + 5(20 - x) = 7 - 2$ بحل هذه المعادلة نجد أن:  $x = 14$ بما أن  $y = 20 - x$  فإن  $y = 20 - 14$ 

$$y = 7$$

إذن

إذن حل النظمة المقترحة هو الزوج:  $(14; 7)$ ب. ليكن  $x$  عدد الأطفال و  $y$  عدد الكبار.← الفوج يتكون من 20 زائر إذن:  $x + y = 20$ ← الفوج أدى 72 درهم إذن:  $3x + 5y = 20$

$$\boxed{b = -8} \quad \text{إذن}$$

المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(\Delta)$  الموازي لـ  $(D)$  والمار من  $A(2;-2)$

$$\boxed{y = 3x - 8} \quad \text{هي}$$


**التمرين السادس:**

- .1 أ. متوازي  $ABCDEFGH$  يعني أن:  $CG = 3$ ,  $CG = BF$ ,  $HG = 4$ ,  $HG = AB$  يعني أن المثلث  $CHG$  قائم الزاوية في  $G$ .
- حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:  $CH^2 = HG^2 + CG^2$
- $$CH^2 = 25 \quad \text{إذن: } CH = 5$$

.2 ب. ليكن  $v$  حجم الهرم  $HABCD$

$$v = \frac{AB^2 \times DH}{3} = \frac{AB^2 \times BF}{3} = \frac{4^2 \times 3}{3} = 16$$

$$K = \frac{48}{16} = 3$$

**التمرين الثالث:**

.1

العمر (سنة)
4
25

الحصيص
17
16
15
14
13
12

.2 لنحسب  $m$  المعدل الحسابي للمتسسلة

$$m = \frac{12 \times 2 + 3 \times 13 + 7 \times 14 + 15 + 8 \times 16 + 4 \times 17}{25} = 14,84$$

العمر المتوسط للمنخرطين هو المعدل الحسابي للمتسسلة أي: 14,84.


.3 القيمة الوسطية:

الحصيص الإجمالي هو  $n = 25$  و  $\frac{n}{2} = 12,5$

بما أن  $13 < 12,5 < 15$  والميزة المرافقة للحصيص المترافق  $13$  هي  $15$  فإن  $15$  هي القيمة الوسطية لهذه المتسسلة.

**التمرين الرابع:**

.1



.2 . [EG] قطر للدائرة  $(C)$ , إذن  $H$  منتصف  $[EG]$

$$H\left(\frac{x_E + x_H}{2}; \frac{y_E + y_H}{2}\right) \quad \text{إذن:}$$


$$H\left(\frac{6+(-2)}{2}; \frac{3+(-3)}{2}\right) \quad \text{إذن:}$$

$$H(2;0) \quad \text{إذن:}$$

.3 . ليكن  $r$  شعاع الدائرة  $(C)$

$$r = \frac{EG}{2} \quad [EG] \text{ قطر للدائرة يعني أن:}$$

ب. التمثيل المباني للدالة  $g$  هو المستقيم المار من النقطتين  $M(0;3)$  و  $N(-1;1)$

**التمرين الثالث:**

.1

العمر (سنة)
4
25

الحصيص
17
16
15
14
13
12

.2 لنحسب  $m$  المعدل الحسابي للمتسسلة

$$m = \frac{12 \times 2 + 3 \times 13 + 7 \times 14 + 15 + 8 \times 16 + 4 \times 17}{25} = 14,84$$

العمر المتوسط للمنخرطين هو المعدل الحسابي للمتسسلة أي: 14,84.

.3 القيمة الوسطية:

الحصيص الإجمالي هو  $n = 25$  و  $\frac{n}{2} = 12,5$

بما أن  $13 < 12,5 < 15$  والميزة المرافقة للحصيص المترافق  $13$  هي  $15$  فإن  $15$  هي القيمة الوسطية لهذه المتسسلة.

**التمرين الرابع:**

.1

← المعامل الموجه لـ  $(D)$  هو  $3$

← المعامل الموجه لـ  $(D')$  هو  $\frac{-1}{3}$

بما أن  $-1 < \frac{-1}{3} < 3$  فإن المستقيمين  $(D)$  و  $(D')$  متزايدان.

$$(\Delta): y = ax + b$$

▪ لتحديد  $a$  و  $b$ .

← لتحديد  $a$  (ميل المستقيم  $(\Delta)$ ) .

← لتحديد  $b$  (إذن لهما نفس الميل).

بما أن ميل المستقيم  $(D)$  هو  $3$  فإن  $a = 3$

← لتحديد  $b$ .

النقطة  $(-2; 2)$  تنتهي إلى  $(\Delta)$

$$-2 = 3 \times (-2) + b \quad \text{إذن:}$$

$$b = -2 - 6 \quad \text{إذن:}$$

نحسب :  $EG$  -

$$\begin{aligned}
 EG &= \sqrt{(x_G - x_E)^2 + (y_G - y_E)^2} \\
 &= \sqrt{(-2 - 6)^2 + (-3 - 3)^2} \\
 &= \sqrt{(-8)^2 + (-6)^2} \\
 &= \sqrt{64 + 36} \\
 &= \sqrt{100} \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

$$r = \frac{10}{2} = 5 \quad \text{وبالتالي فإن:}$$

.4

أ. صورة  $(C')$  بـالإزاحة  $T$  ، إذن  $(C)$  و  $(C')$  لهما نفس الشعاع .  
إذن شعاع الدائرة  $(C')$  هو 5.

ب. لتكن  $(x_{H'}; y_{H'})$  إحداثيات النقطة  $H'$  هي صورة النقطة  $H$  بـالإزاحة  $T$  التي تحول  $E$  إلى  $F$ .

$$\overrightarrow{HH'} = \overrightarrow{EF} \quad \text{إذن:}$$

$$\overrightarrow{HH'}(x_{H'} - 2; y_{H'}) \text{ و } \overrightarrow{EF}(-4; 2) \text{ بما أن:}$$

$$H'(-2; 2) \quad \begin{cases} x_{H'} = -2 \\ y_{H'} = 2 \end{cases} \quad \text{إذن: يعني أن:} \quad \begin{cases} x_{H'} - 2 = -4 \\ y_{H'} = 2 \end{cases} \quad \text{فإن:}$$

الموضوعالتمرين الرابع:

في المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم  $(O, I, J)$  نعتبر النقطتين  $A(2, 2)$  و  $B(-1, 3)$  والمستقيم  $(\Delta)$  الذي معادلته  $y = -\frac{1}{2}x + 3$ .

- (1) هل صحيح أن النقطة  $A$  تنتهي إلى المستقيم  $(\Delta)$ ؟
- (2) حدد زوج إحداثي المتجهة  $\overrightarrow{AB}$  ثم احسب المسافة  $.AB$ .
- (3) أنشئ  $A$  و  $B$  و  $(\Delta)$  في المعلم  $(O, I, J)$ .
- (4) حدد المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(D)$  العمودي على  $(\Delta)$  والمار من  $B$ .
- (5) نعتبر الإزاحة  $t$  التي تحول  $O$  إلى  $B$ .
  - (أ) حدد زوجي إحداثي النقطة  $C$  صورة  $A$  بالإزاحة  $t$ .
  - (ب) أنشئ صورة  $(\Delta)$  بالإزاحة  $t$ .

التمرين الخامس:

(1) أسطوانة قطر قاعدتها  $6m$  وارتفاعها  $9m$ . احسب حجم الأسطوانة  $(C)$  تكبير  $(C_1)$  بنسبة  $2$ . (نأخذ  $\pi = 3.14$ ).

$ABCD$  متوازي المستطيلات قاعدته  $ABCD$  (2)

مربع وارتفاعه  $.h = AE$

- (أ) نفترض أن  $AB = 15m$  و  $h = 10m$ . احسب  $.AG$ .
- (ب) نفترض الآن أن  $AB = 15m$  و  $h$  غير معروف وأن متوازي المستطيلات مملوء بسائل.

حدد أكبر عدد صحيح قيمة  $h$  لكي تكون الأسطوانة  $(C)$  كافية لاحتواء هذا السائل.

التمرين السادس:

توصلت إحدى دور الطالب بعدد من الكتب يفوق عدد الطلبة بـ  $150$  كتاب. ولكي يحصل كل طالب على  $5$  كتب، وجب شراء  $10$  كتب إضافية.

حدد عدد الكتب وعدد الطلبة.

التمرين الأول:


$$\text{(1) حل المعادلة } .3(5x - 2) - 2 = 7x$$

$$\text{(2) حل المترابحة } .12x + 5 \geq 8x - 5$$

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases} \text{(3) حل النظمة}$$

التمرين الثاني:

يمثل المبيان جانبه توزيع مساهمات تلاميذ أحد الأقسام لمساعدة زميل لهم في شراء الأدوات المدرسية.



(1) حدد منوال هذه المتسلسلة الإحصائية.

(2) انقل واتهم الجدول التالي:

المساهمة (بـ DH)	50			20
عدد التلاميذ		7	2	

(3) تحقق من أن معدل مساهمات التلاميذ يساوي  $28$ .

التمرين الثالث:

(1) نعتبر الدالة التالية  $f$  المعرفة بالصيغة التالية  $f(x) = 3x + 4$ .

(أ) احسب  $f(0)$ .

(ب) حدد العدد الحقيقي الذي صورته الدالة  $f$  هي  $1$ .

(ج) أنشئ التمثيل المباني  $(\Delta)$  للدالة  $f$  في معلم متعمد منظم.

(2) لتكن  $g$  الدالة الخطية التي تمثلها المباني  $(D)$  يوازي  $(\Delta)$ .

(أ) أنشئ  $(D)$  في نفس المعلم.

(ب) حدد صيغة  $g$ .

الحل

$$\begin{cases} x = 1 - y \\ -5y = 8 - 3 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x = 1 - y \\ -5y = 5 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x = 1 - y \\ y = -1 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

حل النقطة هو الزوج  $(2, -1)$ .

التمرين الثاني:

1) قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص هي 20.  
إذن 20 هو منوال المتسلسلة.

(2) المشاركة (بـ DH)				
50	30	25	20	عدد التلاميذ
4	7	2	12	

3) ليكن  $m$  معدل مساهمات التلاميذ.

$$m = \frac{20 \times 12 + 25 \times 2 + 30 \times 7 + 50 \times 4}{12 + 2 + 7 + 4} = \frac{240 + 50 + 210 + 200}{25} = \frac{700}{25} = 28$$

إذن معدل مساهمات التلاميذ يساوي 28.

التمرين الثالث:

1) دالة تأقية المعرفة بما يلي:  $f(x) = 3x + 4$

أ. حساب  $f(0)$

$$f(0) = 3 \times 0 + 4 = 4$$

ب. ليكن  $\alpha$  العدد الحقيقي الذي صورته بالدالة  $f$  هي 1  
إذن:  $f(\alpha) = 1$

$$3\alpha + 4 = 1$$

بعد حل المعادلة نجد  $-1 = -3$

إذن العدد الحقيقي الذي صورته بالدالة  $f$  هي 1 هو -1

التمرين الأول:

1) لنحل المعادلة  $3(5x - 2) - 2 = 7x$

لدينا:  $3(5x - 2) - 2 = 7x$

يعني أن:  $15x - 6 - 2 = 7x$

يعني أن:  $15x - 8 = 7x$

يعني أن:  $15x - 7x = 8$

يعني أن:  $8x = 8$

يعني أن:  $x = 1$

حل المعادلة هو: 1.

2) لنحل المترابطة  $12x + 5 \geq 8x - 5$

لدينا:  $12x + 5 \geq 8x - 5$

يعني أن:  $12x - 8x \geq -5 - 5$

يعني أن:  $4x \geq -10$

يعني أن:  $x \geq \frac{-10}{8}$

يعني أن:  $x \geq \frac{-5}{4}$

جميع الأعداد الحقيقة الأكبر من أو يساوي  $\frac{-5}{4}$  حلول  
المترابطة.

3) لنحل النقطة  $\begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$  بطريق ة التعويض.

لدينا:  $\begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$

يعني أن:  $\begin{cases} x = 1 - y \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$

يعني أن:  $\begin{cases} x = 1 - y \\ 3(1 - y) - 2y = 8 \end{cases}$

يعني أن:  $\begin{cases} x = 1 - y \\ 3 - 3y - 2y = 8 \end{cases}$

$$(D) : y = mx + p \quad (4)$$

- لنحدد  $m$

( $\Delta$ ) عمودي على ( $D$ )

$$m \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \quad \text{إذن:}$$

$$m = (-1) \times \left(-\frac{2}{1}\right) \quad \text{إذن:}$$

$$m = 2 \quad \boxed{m=2} \quad \text{إذن:}$$

- لنحدد  $p$

( $D$ ) تنتهي إلى المستقيم ( $B$ )  $(-1, 3)$

$$y_B = mx_B + p \quad \text{إذن:}$$


$$3 = 2 \times (-1) + p \quad \text{إذن:}$$

$$3 = -2 + p \quad \text{إذن:}$$

$$p = 5 \quad \boxed{p=5} \quad \text{إذن}$$

المعادلة المختصرة للمستقيم ( $D$ ) هي:  $y = 2x + 5$

ج. التمثيل المباني للدالة  $f$ .  
بما أن  $f(0) = 4$  و  $f(-1) = 1$  فإن التمثيل المباني  
للدالة  $f$  هو المستقيم ( $\Delta$ ) المار من النقطتين  $A(0, 4)$  و  
 $B(-1, 1)$ .



أ. صورة  $A$  بالإزاحة  $t$  يعني أن:  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB}$

$$\begin{cases} x_c - x_A = x_B - x_O \\ y_c - y_A = y_B - y_O \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x_c - 2 = -1 - 0 \\ y_c - 2 = 3 - 0 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x_c = 2 - 1 \\ y_c = 3 + 2 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x_c = 1 \\ y_c = 5 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\boxed{C(1,5)} \quad \text{إذن:}$$

ب. أنظر الشكل السابق. (صورة ( $\Delta$ ) بالإزاحة  $t$  هي المستقيم المار من  $C$  والموازي لـ ( $\Delta$ )).

### التمرين الخامس:



1. ليكن  $v$  حجم الأسطوانة ( $C$ ) و  $v_1$  حجم الأسطوانة ( $C_1$ ).  
 $v = 2^3 v_1$  (تكبير ( $C_1$ ) بنسبة 2 إذن:).

لنحدد  $v_1$ . شعاع قاعدة ( $C$ ) هو 3.

$$v_1 = \pi \times 3^2 \times 9 = 3.14 \times 9 \times 9 = 254.34 m^3 \quad \text{إذن:}$$

$$v = 2^3 \times 84.72 = 8 \times 254.34 \quad \text{إذن:}$$

$$v = 2034.72 m^3 \quad \text{إذن:}$$

- (2) أ. أنظر الشكل السابق.  
ب. صيغة الدالة  $g$  هي:  $g(x) = 3x$   
لأن ( $\Delta$ ) // ( $D$ ) إذن للمسقطين نفس الميل 3.

### التمرين الرابع:


1. نعم النقطة  $A$  تنتهي إلى المستقيم ( $\Delta$ ).

$$-\frac{1}{2}x_A + 3 = -\frac{1}{2} \times 2 + 3 = -1 + 3 = 2 = y_A \quad \text{لأن:}$$

(إحداثي النقطة  $A$  تحقق معادلة المستقيم ( $\Delta$ )).

(2) إحداثي المتجهة  $\overrightarrow{AB}$  -  
علم أن:  $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A)$   
إذن:  $\overrightarrow{AB}(-1 - 2, 3 - 2)$   
إذن:  $\overrightarrow{AB}(-3, 1)$   
المسافة  $.AB$  -  
بما أن:  $\overrightarrow{AB}(-3, 1)$   
فإن:  $AB = \sqrt{(-3)^2 + 1^2}$   
إذن:  $AB = \sqrt{9 + 1}$   
إذن:  $AB = \sqrt{10}$

(3) النقطة  $M(0, 3)$  تنتهي إلى المستقيم ( $\Delta$ ).



التمرين السادس:- ليكن  $x$  عدد الكتب.- ليكن  $y$  عدد الطلبة.

عدد الكتب يفوق عدد الطلبة بـ 150 كتاب،

$$x = y + 150 \quad \text{إذن:}$$

لكي يحصل كل طالب على 5 كتب، وجب شراء 10 كتب إضافية.

$$\frac{x+10}{5} = y \quad \text{إذن:}$$


$$\begin{cases} x = y + 150 \\ \frac{x+10}{5} = y \end{cases} \quad \text{نحصل على النظمة التالية:}$$

$$\begin{cases} x - y = 150 \\ x - 5y = -10 \end{cases} \quad \text{أي:}$$

حل النظمة هو الزوج (190, 40).

- عدد الكتب هو 190.

- عدد الطلبة هو: 40.

لنسكب:  $AC$ .المثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $B$ .

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$AC = \sqrt{15^2 + 15^2} = 15\sqrt{2}$$

لنسكب:  $AG$ .

$$(GC) \perp (DC) \text{ و } (GC) \perp (BC)$$

$$(GC) \perp (BDC)$$

بما أن  $(AC) \subset (BDC)$ 

$$\text{إذن: } (GC) \perp (AC)$$

المثلث  $AGC$  قائم الزاوية في  $C$ .

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:

$$AG^2 = AC^2 + GC^2$$

$$AG = \sqrt{2 \times 15^2 + 10^2}$$

$$AG = \sqrt{550}$$

ب. حجم متوازي المستطيلات في هذه الحالة في هذه الحالة هو:

$$15^2 \times h$$

الأسطوانة  $(C)$  كافية لاحتواء السائل.

$$\text{يعني أن: } 15^2 \times h \leq v$$

$$\text{يعني أن: } 225 \times h \leq 2034.72$$

$$\text{يعني أن: } h \leq \frac{2034.72}{225}$$

$$\text{إذن: } h \leq 9.04$$

أكبر عدد صحيح طبيعي نسبي أصغر من 9.04 هو 9.

إذن: أكبر عدد صحيح قيمة  $h$  لكي تكون الأسطوانة  $(C)$  كافية


لاحتواء هذا السائل هو 9.

الموضوع

- أ. هل  $g$  دالة خطية؟  
 ب. احسب  $(-2) \cdot g$ .  
 ج. حدد العدد الذي صورته  $\frac{3}{2}$  بالدالة  $g$  ، مطلا جوابك (دون تحديد معادلة  $(d)$ ).  
 (3) أنشئ النقطة  $F'$  صورة  $F$  بالإزاحة التي تحول  $E$  إلى  $O$ .  
 (4) بين أن صورة  $(d)$  بهذه الإزاحة هي التمثيل المباني للدالة  $f$ .

**التمرين الخامس:**  
 مكعب  $ABCDEFGH$  حيث  $AB = 8$  و  $S$  مركز المربع  $[HE]$ . النقط  $I$  و  $J$  و  $K$  و  $L$  هي منتصفات القطع  $ABCD$  و  $[EF]$  و  $[FG]$  و  $[GH]$  على التوالي.

- (1) احسب المسافة  $IJ$ .  
 (2) احسب حجم الهرم  $SIJKL$ .

**التمرين السادس:**

اشترى صديقان من متجر مصابيح كهربائية. دفع أحدهما مبلغ 31 درهما مقابل مصباح اقتصادي واحد وثلاث مصابيح عادية. ودفع الآخر مبلغ 57 درهما مقابل مصابحين اقتصاديين وخمسة مصابيح عادية.

أعطيتك 100 درهما وطلبت منك شراء مصابحين من هذا المتجر بحيث يكون عدد المصابيح العادية ضعف عدد المصابيح الاقتصادية.

ما هو العدد الأقصى من المصابيح التي يمكنك شراؤها؟

**التمرين الأول:**

- (1) حل المعادلة:  $3(4x+2)-3=5x$   
 (2) حل المتراجحة:  $5x-2 < 2(x+5)$

**التمرين الثاني:**

يعطي الجدول التالي عدد أطفال كل أسرة من الأسر القاطنة في عمارة سكنية:

5	4	3	2	1	عدد الأطفال
4	5	8	6	2	عدد الأسر

- (1) احسب معدل أطفال هذه الأسر.

- (2) ما هو عدد الأسر التي يفوق عدد أطفالها المعدل؟

**التمرين الثالث:**

معلم متعمد منظم للمستوى.

- (1) حدد المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(D)$  الذي ميله 2 - والمار من النقطة  $A(1, -1)$ .

- (2) حدد إحداثي المتجهة  $\vec{AB}$  ثم احسب المسافة  $AB$  حيث  $B(3, 0)$

- (3) ليكن  $(\Delta)$  المستقيم المحدد بمعادلته المختصرة  $y = \frac{1}{2}x - 2$

- أ. تحقق من أن  $(D)$  و  $(\Delta)$  متعمدان.


- ب. حدد الوضع النسبي للمستقيمين  $(D)$  و  $(AB)$ .

**التمرين الرابع:**

- (1)  $f$  دالة خطية بحيث  $3 = f(2)$ . حدد صيغة الدالة  $f$ .

- (2) معلم متعمد منظم في المستوى.  $(d)$  مستقيم

يمثل دالة عدبية  $g$ ،  $E$  و  $F$  نقطتان منه.



الحل

$$\begin{aligned} b &= -1 + 2 \quad \text{إذن} \\ b &= 1 \quad \text{إذن} \\ y &= -2x + 1 \quad \text{إذن معادلة المستقيم } (D) \text{ هي} \end{aligned}$$

. (2) - تحديد إحداثي المتجهة  $\overrightarrow{AB}$ .

نعلم أن:  $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A)$

ومنه:  $\overrightarrow{AB}(3 - 1, 0 - (-1))$

إذن:  $\boxed{\overrightarrow{AB}(2, 1)}$

- حساب المسافة  $AB$ .

بما أن  $\overrightarrow{AB}(2, 1)$

$AB = \sqrt{2^2 + 1^2}$  فإن

ومنه:  $\boxed{AB = \sqrt{5}}$

(3)

$$(D): y = -2x + 1 \quad (\Delta): y = \frac{1}{2}x - 2 \quad .$$

$$(-2) \times \frac{1}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

إذن جداء ميلي المستقيمين يساوي -1.

ومنه فإن المستقيمان  $(D)$  و  $(\Delta)$  متعامدين.

. ب.

- لنحدد  $m$  ميل المستقيم  $(AB)$ .

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{نعلم أن}$$

$$m = \frac{0 - (-1)}{3 - 1} \quad \text{إذن:}$$

$$m = \frac{1}{2} \quad \text{إذن:}$$

-  $(AB)$  و  $(\Delta)$  متوازيين لأن لهما نفس الميل.

- بما أن  $(D)$  و  $(\Delta)$  متعامدين فإن  $(D)$  و  $(AB)$  متعامدين.

التمرين الرابع:

$$(1) \text{ نضع } f(x) = ax$$

$$f(2) = 3 \quad \text{بما أن:}$$

$$3 = a \times 2 \quad \text{إذن:}$$

$$a = \frac{3}{2} = 1.5 \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{f(x) = 1.5x} \quad \text{إذن:}$$

التمرين الأول:

$$3(4x + 2) - 3 = 5x \quad (1) \quad \text{ حل المعادلة:}$$

$$3(4x + 2) - 3 = 5x \quad \text{لدينا:}$$

$$12x + 6 - 3 = 5x \quad \text{يعني أن}$$

$$12x + 3 = 5x \quad \text{يعني أن}$$

$$12x - 5x = -3 \quad \text{يعني أن}$$

$$7x = -3 \quad \text{يعني أن}$$

$$x = \frac{-3}{7} \quad \text{يعني أن}$$

$$\text{المعادلة تقبل حل واحد وهو: } \frac{-3}{7} \quad .$$

$$5x - 2 < 2(x + 5) \quad (2) \quad \text{ حل المترابحة:}$$

$$5x - 2 < 2(x + 5) \quad \text{لدينا:}$$

$$5x - 2 < 2x + 10 \quad \text{يعني أن}$$

$$5x - 2x < 10 + 2 \quad \text{يعني أن}$$

$$7x < 12 \quad \text{يعني أن}$$

$$x < \frac{12}{7} \quad \text{يعني أن}$$

جميع الأعداد الأصغر قطعاً من  $\frac{12}{7}$  حلول للمترابحة.

التمرين الثاني:

(1) ليكن  $m$  معدل أطفال هذه الأسر.

$$\begin{aligned} m &= \frac{2 \times 1 + 6 \times 2 + 8 \times 3 + 5 \times 4 + 4 \times 5}{2 + 6 + 8 + 5 + 4} \\ &= \frac{2 + 12 + 24 + 20 + 20}{25} \\ &= \frac{78}{25} \\ &= 3.12 \end{aligned}$$

معدل أطفال الأسر هو 3.12.

(2) عدد الأسر التي يفوق عدد أطفالها المعدل هو 9 ( $4 + 5 = 9$ )

التمرين الثالث:

(1) نضع  $y = ax + b$  معادلة المستقيم  $(D)$ .

ميل المستقيم  $(D)$  هو -2 - إذن  $a = -2$ .

إذن  $y = -2x + b$ .


- لنحدد  $b$ .

النقطة  $A(1, -1)$  تنتمي إلى المستقيم  $(D)$ .

إذن  $y_A = -2x_A + b$

إذن  $-1 = -2 \times 1 + b$

## التمرين الخامس:

(1) حساب المسافة  $IJ$ 

المثلث  $IEJ$  قائم الزاوية في  $E$ .


إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$IJ^2 = IE^2 + EJ^2$$

$$IJ^2 = 4^2 + 4^2 = 2 \times 4^2$$

$$IJ = \sqrt{2 \times 4^2}$$

$$\boxed{IJ = 4\sqrt{2}}$$

(2) حساب  $v$  حجم الهرم  $SIJKL$ 

$$v = \frac{1}{3} B \times h \quad \text{نعلم أن:}$$

$$h = 8 \quad B = (4\sqrt{2})^2 = 32$$

$$v = \frac{1}{3} \times 32 \times 8$$

$$\boxed{v = \frac{256}{3}}$$

(2)


أ. لا،  $g$  دالة تألفية، لأن تمثيلها المباني لا يمر من أصل المعلم.

ب.  $g(-2) = 0$  لأن النقطة التي أقصولها  $-2$  في المستقيم  $(d)$  أرتوبها هو  $0$ .

ج. العدد الذي صورته  $\frac{3}{2}$  بالدالة  $g$  هو  $-1$ ، لأن النقطة التي

إحداثياتها  $\left(-1, \frac{3}{2}\right)$  تنتهي إلى المستقيم  $(d)$ .

(3)



صورة المستقيم  $(d)$  هي المستقيم المار من  $O$  (أصل المعلم) والنقطة  $F$ .

- لنحدد إحداثيات النقطة  $F$ .

إحداثيات المتجهة  $\vec{EO}$  هي  $(1; -1.5)$ .

بما أن  $\vec{EO} = \vec{FF'}$

إذن إحداثيات المتجهة  $\vec{FF'}$  هي  $(1; -1.5)$  كذلك.

وبما أن  $\vec{FF'}(x_{F'}, 0, y_{F'}, -3)$

أي أن:  $\vec{FF'}(x_{F'}, y_{F'}, -3)$

$$\begin{cases} x_{F'} = 1 \\ y_{F'} - 3 = -1.5 \end{cases} \quad \text{فإن:}$$

$$\begin{cases} x_{F'} = 1 \\ y_{F'} = 1.5 \end{cases} \quad \text{إذن:}$$

$F'(1; 1.5)$  إذن:

النقطة  $F'$  تنتهي إلى التمثيل المباني للدالة  $f$  لأن

$$f(x_{F'}) = f(1) = 1.5 \times 1 = 1.5 = y_{F'}$$

إذن صورة  $(d)$  بهذه الإزاحة هي التمثيل المباني للدالة  $f$ .

**التمرين السادس:**

- لنحدد ثمن كل مصباح .
  - ليكن  $x$  ثمن المصباح الاقتصادي.
  - ليكن  $y$  ثمن المصباح العادي.
- دفع الأول مبلغ 31 درهما مقابل مصباح اقتصادي واحد وثلاث مصابيح عادية.

$$\text{أي: } x + 3y = 31$$

دفع الثاني مبلغ 57 درهما مقابل مصابيح اقتصاديين وخمسة مصابيح عادية.

$$\text{أي: } 2x + 5y = 57$$

نحصل على النظمة التالية:

$$\begin{cases} x + 3y = 31 \\ 2x + 5y = 57 \end{cases}$$

- لحل النظمة بطريقة التأليفية الخطية.

$$\begin{cases} x + 3y = 31 \\ 2x + 5y = 57 \end{cases} \quad \text{لدينا:}$$

$$\begin{cases} 2x + 6y = 62 \\ 2x + 5y = 57 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x + 3y = 31 \\ y = 5 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x + 15 = 31 \\ y = 5 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\begin{cases} x = 16 \\ y = 5 \end{cases} \quad \text{يعني أن:}$$

حل النظمة هو الزوج: (16,5)

ثمن المصباح الاقتصادي هو 16 درهم.

ثمن المصباح العادي هو 5 دراهم.

- لنحدد العدد الأقصى من المصابيح التي يمكن شرائها بـ 100 درهم بحيث يكون عدد المصابيح العادية ضعف عدد المصابيح الاقتصادية.

- ليكن  $n$  عدد المصابيح الاقتصادية التي يمكن شرائها.

- إذن:  $2n$  عدد المصابيح العادية التي يمكن شرائها.

نستنتج المتراجحة التالية:

$$n \times 16 + 2n \times 5 \leq 100 \quad \text{بحل المتراجحة نجد} \quad n \leq \frac{100}{26}$$

أكبر عدد صحيح طبيعي أصغر من  $\frac{100}{26}$  هو 3.

إذن يمكن شراء 3 مصابيح اقتصادية و 6 مصابيح عادية.

الموضوع

- (أ) أنشئ في معلم متعدد منمنظم  $(O, I, J)$  التمثيل المباني  $(OI = OJ = 1\text{cm})$  للدالة الخطية  $f$ .
- (ب) حدد  $f(x)$  بدلالة  $x$ .
- (2) لتكن  $g$  الدالة التالية التي معاملها 2 و  $g(0) = -3$ .
- (أ) بين أن  $g(x) = 2x - 3$ .
- (ب) أنشئ  $(T')$  التمثيل المباني للدالة  $g$  في نفس المعلم  $(O, I, J)$ .
- (3) حدد إحداثي النقطة  $H$  تقاطع  $(T)$  و  $(T')$ .

التمرين الخامس:


نعتبر  $EFG$  مثلثا والنقطة  $I$  منتصف  $[EF]$ . لتكن  $t$  الإزاحة التي تحول النقطة  $I$  إلى النقطة  $G$ .

- (1) أنشئ المثلث  $EFG$  والنقطة  $I$ .
- (ب) أنشئ النقطة  $E'$  صورة النقطة  $E$  بالإزاحة  $t$ .
- (2) لتكن  $(C)$  الدائرة التي مركزها  $I$  وشعاعها  $IE$  وصورتها  $(C')$  بالإزاحة  $t$ .
- بين أن النقطة  $F'$  صورة النقطة  $F$  بالإزاحة  $t$  تتبع إلى الدائرة  $(C')$ .

التمرين السادس:

نعتبر  $SABCD$  هرما قاعدته مربع  $ABCD$  بحيث  $(SA)$  عمودي على المستوى  $(ABC)$  في  $A$  بحيث  $AB = 4m$  و  $SA = 6m$ .

- (1) بين أن حجم الهرم يساوي  $32m^3$ .
- (2) احسب  $V$  حجم الهرم الذي سنحصل عليه بعد تكبير الهرم  $SABCD$  بنسبة 3.
- (3) احسب  $SC$ .

التمرين الأول:

(1) حل المعادلين التاليتين:

$$4x - 12 = -5x + 15 \quad (1)$$

$$\left( x + \frac{3}{5} \right) \left( x + \frac{1}{2} \right) - 2x \left( x + \frac{1}{2} \right) = 0 \quad (2)$$

حل المترابحة التالية:

$$\begin{cases} x + y = 26 \\ 4x + 3y = 88 \end{cases} \quad (3)$$

التمرين الثاني:

المستوى منسوب إلى معلم متعدد منمنظم  $(O, I, J)$  ، نعتبر النقطتين  $A(3, 2)$  و  $B(-2, 3)$  والمستقيم  $(\Delta)$  ذي المعادلة المختصرة:

$$y = \frac{-x}{5} + \frac{13}{5} \quad (1)$$

(أ) بين أن النقطة  $I\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$  هي منتصف القطعة  $[AB]$ .

(ب) تحقق من أن النقطتين  $A$  و  $B$  تنتهي إلى  $(\Delta)$ .

(2) أعط المعادلة المختصرة للمستقيم  $(D)$  المار من  $I$

و العمودي على  $(\Delta)$ .

(ب) أنشئ النقطتين  $A$  و  $B$  والمستقيم  $(D)$ .

(ج) استنتج أن المثلث  $IOA$  قائم الزاوية.

التمرين الثالث:

يعطى الجدول التالي توزيع تلاميذ أحد الأقسام حسب عدد الرياضيات التي يمارسونها خارج مؤسساتهم.

عدد الرياضيات	عدد التلاميذ
4	3
2	2
1	8
0	1
12	

(1) حدد متواال هذه المتسلسلة الإحصائية.

(2) حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية.

(3) احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية.

التمرين الرابع:

(1) نعتبر الدالة الخطية  $f$  بحيث:  $f(2) = \frac{5}{2}$

الحل

$$\begin{cases} -4x - 4y = (-4) \times 26 \\ 4x + 3y = 88 \end{cases}$$

يعني أن:

$$\begin{cases} -4x - 4y = -104 \\ 4x + 3y = 88 \end{cases}$$

يعني أن:

نجمع المعادلتين طرفا بطرف نحصل على المعادلة:  
 $-y = -16$

$$y = 16$$

أي أن:  
 $x = 26 - y$  فإن:  
 بما أن  $y = 16$  فإن:

$$x = 10$$

إذن:

حل النظمة هو الزوج:  $(10, 16)$ .

التمرين الثاني:

$B(-2, 3)$  و  $A(3, 2)$  (1).  
 أ.  $I$  هي منتصف القطعة  $[AB]$ .

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

إذن:

$$I\left(\frac{3+(-2)}{2}, \frac{2+3}{2}\right)$$

إذن:

$$I\left(\frac{-1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

إذن:

.  $I\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$  هي منتصف القطعة  $[AB]$ .

$$(\Delta): y = \frac{-x}{5} + \frac{13}{5}$$

ب. النقطة  $A$  -

$$\frac{-x_A}{5} + \frac{13}{5} = \frac{-3}{5} + \frac{13}{5} = \frac{-3+13}{5} = \frac{10}{5} = 2 = y_A$$

$$y_A = \frac{-x_A}{5} + \frac{13}{5}$$

إذن:

ومنه فإن النقطة  $A$  تنتمي إلى المستقيم  $(\Delta)$ .  
 - النقطة  $B$  -

$$\frac{-x_B}{5} + \frac{13}{5} = \frac{-(-2)}{5} + \frac{13}{5} = \frac{2+13}{5} = \frac{15}{5} = 3 = y_B$$

$$y_B = \frac{-x_B}{5} + \frac{13}{5}$$

إذن:

ومنه فإن النقطة  $B$  تنتمي إلى المستقيم  $(\Delta)$ .

التمرين الأول:

(1)

أ. حل المعادلة:  $4x - 12 = -5x + 15$ لدينا:  $4x - 12 = -5x + 15$ يعني أن:  $4x + 5x = 15 + 12$ يعني أن:  $9x = 27$ 

$$x = \frac{27}{9}$$

يعني أن:

$$x = 3$$

يعني أن:

المعادلة تقبل حل واحد وهو: 3.

$$\left(x + \frac{3}{5}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) - 2x\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\left(x + \frac{3}{5}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) - 2x\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0$$

لدينا:

$$\left(x + \frac{3}{5} - 2x\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0$$

يعني أن:

$$x + \frac{3}{5} - 2x = 0 \quad \text{أو} \quad x + \frac{1}{2} = 0$$

يعني أن:

$$-x + \frac{3}{5} = 0 \quad \text{أو} \quad x = -\frac{1}{2}$$

يعني أن:

$$x = \frac{3}{5} \quad \text{أو} \quad x = -\frac{1}{2}$$

يعني أن:

المعادلة تقبل حللين هما:  $\frac{3}{5}$  و  $-\frac{1}{2}$

(2) حل المتراجحة التالية:  $3x - 7 \leq x + 5$ لدينا:  $3x - 7 \leq x + 5$ يعني أن:  $3x - x \leq 7 + 5$ يعني أن:  $2x \leq 12$ 

$$x \leq \frac{12}{2}$$

يعني أن:

$$x \leq 6$$

يعني أن:

جميع الأعداد الحقيقة الأصغر من أو يساوي 6 حلول للمtragحة.

$$\begin{cases} x + y = 26 \\ 4x + 3y = 88 \end{cases}$$

حل النظمة التالية: (3)

لتحل النظمة بطريقة التأليف الخطية.

$$\begin{cases} x + y = 26 \\ 4x + 3y = 88 \end{cases}$$

لدينا:

- (2) الحصيف الإجمالي للمتسسلة هو:  $25 \div 2 = 12.5$   
بما أن نصف الحصيف الإجمالي هو:  $12.5 \div 2 = 6.25$   
وأصغر حصيف متراكم أكبر من أو يساوي 12.5 هو 13.  
قيمة الميزة الموافقة للحصيف المتراكم 13 هي 1.  
إذن القيمة الوسطية هي 1.  
(3) نضع  $m$  المعدل الحسابي للمتسسلة.

$$m = \frac{0 \times 12 + 1 \times 1 + 2 \times 8 + 3 \times 2 + 4 \times 2}{25} = \frac{31}{25}$$

إذن:  $m = 1.24$   
إذن المعدل الحسابي للمتسسلة هو 1.24

**التمرين الرابع:**


$$\cdot f(2) = \frac{5}{2} \quad f \text{ دالة خطية بحيث: } \quad (1)$$

أ. التمثيل المباني للدالة  $f(T)$ .

- بما أن  $f$  دالة خطية فإن المستقيم  $(T)$  يمر من أصل المعلم.

- بما أن  $f(2) = \frac{5}{2}$  فإن المستقيم  $(T)$  يمر من النقطة ذات

. الإحداثيات  $\left(2, \frac{5}{2}\right)$



$$\frac{5}{2} \div 2 = \frac{5}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{4} \quad \text{بما أن:}$$

$$f(x) = \frac{5}{4}x \quad \text{فإن:}$$

$$\cdot g(0) = 2 \quad g \text{ دالة تالية معاملها 2 و } -3 \quad (2)$$

$$g(x) = ax + b \quad \text{أ. نضع}$$

$$\cdot a = 2 \quad \text{لأن معامل الدالة هو 2.}$$

- لتحديد  $b$ .

$$\text{بما أن } -3 = 2 \times 0 + b \quad \text{إذن: } g(0) = -3$$

$$b = -3 \quad \text{إذن:}$$

$$g(x) = 2x - 3 \quad \text{إذن:}$$

أ. لتكن  $b$  المعادلة المختصرة للمستقيم  $(D)$ :  $y = ax + b$

المار من  $I$  والعمودي على  $(\Delta)$ .

- لتحديد  $a$  ميل المستقيم  $(D)$ .

المستقيم  $(D)$  عمودي على  $(\Delta)$

$$a \times \frac{-1}{5} = -1 \quad \text{إذن:}$$

$$a = -1 \times \frac{5}{-1} \quad \text{إذن:}$$

$$a = 5 \quad \text{إذن:}$$

- لحدد  $b$  الأرتبوب عند الأصل.

النقطة  $I$  تنتهي إلى المستقيم  $(D)$

$$y_I = 5x_I + b \quad \text{إذن:}$$


$$\frac{5}{2} = 5 \times \frac{1}{2} + b \quad \text{إذن:}$$

$$\frac{5}{2} = \frac{5}{2} + b \quad \text{إذن:}$$

$$b = 0 \quad \text{إذن:}$$

$$(D): y = 5x \quad \text{ومنه فإن:}$$

ب.



ج.

المستقيم  $(D)$  يمر من النقطة  $O$  أصل المعلم.

إذن  $(OI) \perp (IA)$ .

ومنه فإن المثلث  $IOA$  قائم الزاوية في  $I$ .

**التمرين الثالث:**

(1) قيمة الميزة التي لها أكبر حصيف هي 0.

إذن 0 هو منوال هذه المتسسلة الإحصائية.

الحصيف المترافق	الحصيف	قيم الميزة
25	23	4
	21	3
	13	2
	12	1
	12	0

### التمرين السادس:

(1)  $SA$  عمودي على  $(ABC)$  ويمر من الرأس  $S$ .

إذن:  $SA$  ارتفاع للهرم.

ليكن  $v$  حجم الهرم:

$$ABCD \text{ مساحة القاعدة } S_{ABCD} \text{ بحيث } v = \frac{1}{3} \times S_{ABCD} \times SA$$

مربع إذن:  $ABCD$

$$v = \frac{1}{3} \times 16 \times 6 \quad \text{إذن:}$$

$$v = 32m^3 \quad \text{إذن:}$$


$V$ : حجم الهرم بعد تكبيره بنسبة 3.

$$V = 3^3 \times v \quad \text{إذن:}$$

$$V = 27 \times 32 \quad \text{إذن:}$$

$$V = 864m^3 \quad \text{إذن:}$$

.  $SC$  حساب (3)



$$(SA) \perp (AB) \text{ و } (SA) \perp (AD)$$

إذن  $(SA) \perp (ABD)$

بما أن  $(AC) \subset (ABD)$

إذن:  $(SA) \perp (AC)$

المثلث  $SAC$  قائم الزاوية في  $A$ .

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:

$$SC = \sqrt{6^2 + (4\sqrt{2})^2} \quad \text{إذن:}$$

$$SC = \sqrt{36 + 32} \quad \text{إذن:}$$

$$SC = \sqrt{68} \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{SC = 2\sqrt{17}} \quad \text{إذن:}$$

ب.  $(T')$ : التمثيل المباني للدالة  $g$ .

- بما أن  $-3 = g(0)$  فإن المستقيم  $(T')$  يمر من النقطة

$$\boxed{B(0, -3)}$$

$$g(1) = 2 \times 1 - 3 = 2 - 3 = -1 \quad -$$

إذن  $(T')$  يمر من النقطة  $C(1, -1)$ .

(3) إحداثي النقطة  $H$  تقاطع المستقيمين  $(T)$  و  $(T')$  هي  $(4, 5)$ .

ملاحظة:


يمكن التأكد جرياً من هذه الإحداثيات جرياً بحل النظمة:

$$\begin{cases} y - \frac{5}{2}x = 0 & \leftarrow (T) \\ y - 2x = -3 & \leftarrow (T') \end{cases}$$

### التمرين الخامس:

(1)

. أ.



ب. أنظر الشكل السابق.

(2) لنبين أن  $F'$  تنتهي إلى  $(C')$

شعاع الدائرة  $(C)$ , بما أن  $(C')$  صورة  $(C)$  بزاوية.

إذن:  $IE$  كذلك شعاع للدائرة  $(C')$ .

مركز الدائرة  $(C')$  هو  $G$  لأن  $G$  هي صورة  $I$  بنفس

الإزاحة

للجواب عن السؤال سنبين أن:  $GF' = IE$

$$(1) \quad GF' = IF \quad \text{إذن: } \begin{cases} t_{IG}(I) = G \\ t_{IG}(F) = F' \end{cases}$$

(2)  $IE = IF$  [  $EF$  ] فإن:

من (1) و (2) نستنتج أن:  $GF' = IF$

إذن  $F'$  تنتهي إلى الدائرة التي مركزها  $G$  وشعاعها  $IF$ .

أي أن:  $F'$  تنتهي إلى الدائرة  $(C')$ .

الموضوعالتمرين الأول:


يضم نادي 25 عضوا تتوزع أعمارهم حسب الكشف التالي:

العمر (بالسنوات)	العمر (السنوات)
15	14
6	5
13	4
12	5
11	3
10	2

- (1) حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية.
- (2) احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية.
- (3) حدد عدد الأعضاء الذين عمرهم أكبر من أو يساوي 13 سنة.

التمرين السادس:

.  $AB = 6$  مكعب بحيث  $ABCDEFGH$



(1) احسب  $.HB$ .

(2) احسب حجم الهرم  $.HABD$

(3) لنكن  $I$  نقطة من القطعة  $[HD]$  بحيث  $HI = 2$ . المستوى

الموازي لل المستوى  $(ABD)$  والمار من  $I$  يقطع  $[HB]$  في  $J$

ويقطع القطعة  $[HA]$  في  $K$ .

(4) احسب مساحة المثلث  $.IJK$

نعتبر الدالتين العدديتين  $f$  و  $g$  بحيث  $f(x) = \frac{3}{2}x$  و  $g(x) = -3x + 9$

(1) احسب  $f(2)$  و  $g(2)$ .

(2) حدد العدد الذي صورته بالدالة  $g$  يساوي 5.

(3) رسم في نفس المعلم المستقيم الممثل للدالة  $f$  و المستقيم الممثل للدالة  $g$ .

التمرين الثالث:

(1) حل النظمة  $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 5y = 10 \end{cases}$

(2) حل المعادلة  $4x^2 - 9 = 0$

التمرين الرابع:

في معلم متواحد منظم  $(O, I, J)$  نعتبر النقط  $A(-2, 1)$  و

$C(2, 2)$  و  $B(1, -2)$

(1) أنشئ النقط  $A$  و  $B$  و  $C$ .

(2) احسب المسافة  $.AC$ .

(3) حدد إحداثي النقطة  $E$  منتصف القطعة  $[AB]$ .

(4)

أ) تحقق من أن المعادلة المختصرة للمستقيم  $(AB)$  هي

$$y = -x - 1$$

ب) حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(\Delta)$  واسط القطعة  $[AB]$

(5) لنكن  $D$  صورة  $C$  بالإزاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{AB}$ .


أ) أنشئ  $D$  في نفس المعلم  $(O, I, J)$ .

ب) حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(CD)$ .

الحل

- التمثيل المباني للدالة  $g$  هو المستقيم المار من النقطة  $A(2,3)$  (لأن  $3 = g(2)$ ) والنقطة  $B(3,0)$  (لأن  $0 = g(3)$ )

$$(g(3)=0)$$

التمرين الثالث:

$$\begin{cases} x+y=4 \\ 3x+5y=10 \end{cases} \quad \text{حل النظمة}$$

لحل النظمة بطريقة التعويض.

$$\begin{cases} x+y=4 & \leftarrow E_1 \\ 3x+5y=10 & \leftarrow E_2 \end{cases}$$

نضع:

" $x$ " في المعادلة  $E_1$ :  $x+y=4$  يعني أن  $y=4-x$  "كتابة  $y$  بدلالة  $x$ "

في المعادلة  $E_2$  نعرض  $y$  بـ:  $4-x$

نحصل على المعادلة:  $3x+20-5x=10$

$$x=5$$

بعد حل هذه المعادلة نجد أن

نعرض  $x$  بـ: 5 في المعادلة  $E_1$  نحصل على المتساوية  $5+y=4$

$$y=-1$$

أي أن

إذن: حل النظمة هو الزوج  $(5, -1)$

$$4x^2-9=0 \quad (2)$$

لدينا:

$$(2x)^2-9=0 \quad \text{يعني أن:}$$

$$(2x)^2-3^2=0 \quad \text{يعني أن:}$$

$$(2x-3)(2x+3)=0 \quad \text{يعني أن:}$$

$$2x-3=0 \quad \text{أو} \quad 2x+3=0 \quad \text{يعني أن:}$$

$$x=\frac{3}{2} \quad \text{أو} \quad x=-\frac{3}{2} \quad \text{يعني أن:}$$

المعادلة تقبل حلين هما:  $\frac{3}{2}$  و  $-\frac{3}{2}$

التمرين الأول:						
الميزة	الحادي	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
الحادي	15	14	13	12	11	10
الثاني	6	5	4	5	3	2
الثالث	25	19	14	10	5	2

1. الحصيف الإجمالي للمتسسلة هو: 25

بما أن نصف الحصيف الإجمالي هو:  $25 \div 2 = 12.5$   
وأصغر حصيف متراكم أكبر من أو يساوي 12.5 هو 14.  
قيمة الميزة الموافقة للحصيف المتراكم 14 هي 13.  
إذن القيمة الوسطية هي 13.

$$2. \text{ نضع } m \text{ المعدل الحسابي للمتسسلة.}$$

$$m = \frac{2 \times 10 + 3 \times 11 + 5 \times 12 + 4 \times 13 + 5 \times 15 + 6 \times 15}{25} = \frac{330}{25}$$

إذن:  $m = 13.2$

إذن المعدل الحسابي للمتسسلة هو 13.2

التمرين الثاني:

$$g(x) = -3x + 9 \quad f(x) = \frac{3}{2}x$$

$$\begin{array}{l|l}
\begin{array}{l} \text{حساب } (2) \\ g(2) = -3 \times 2 + 9 = -6 + 9 \end{array} & \begin{array}{l} \text{حساب } (2) \\ f(2) = \frac{3}{2} \times 2 = 3 \end{array} \\
\hline
\end{array}$$

2. ليكن  $\alpha$  العدد الذي صورته بالدالة  $g$  يساوي 5.

$$\text{إذن: } g(\alpha) = 5$$

$$\text{إذن: } -3\alpha + 9 = 5$$

$$\text{إذن: } -3\alpha = 5 - 9$$

$$\text{إذن: } -3\alpha = -4$$

$$\text{إذن: } \alpha = \frac{-4}{-3}$$

$$\text{إذن: } \alpha = \frac{4}{3}$$

إذن العدد الذي صورته بالدالة  $g$  يساوي 5 هو  $\frac{4}{3}$

3. التمثيل المباني للدالة  $f$  هو المستقيم المار من أصل المعلم

(لأن  $f$  خطية) والنقطة  $A(2,3)$  (لأن  $3 = f(2)$ )

**التمرين الرابع:**

(1)

يعني أن  $(\Delta)$  يمر من  $E$  منتصف القطعة  $[AB]$  وعمودي على المستقيم  $(AB)$  حامل القطعة  $[AB]$ .

- لنحدد  $m$ .

بما أن:  $(\Delta)$  عمودي على  $(AB)$  وميل المستقيم  $(AB)$  هو

$-1$

$$m \times (-1) = -1 \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{m=1} \quad \text{إذن:}$$

- لنحدد  $p$ .

النقطة  $E$  تنتهي إلى المستقيم  $(\Delta)$ .

$$y_E = mx_E + p \quad \text{إذن:}$$

$$\frac{-1}{2} = 1 \times \frac{-1}{2} + p \quad \text{إذن:}$$

$$p = \frac{-1}{2} - \frac{-1}{2} \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{p=0} \quad \text{إذن:}$$

إذن:  $(\Delta)$  هو المنصف الأول.

$$\boxed{(\Delta): y = x}$$

(5)

أ. انظر الشكل السابق.

$$(CD): y = ax + b$$

- لنحدد  $a$ .

صورة  $D$  بالإزاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{AB}$ .

يعني أن الرباعي  $ACDB$  متوازي الأضلاع.

يعني أن المستقيم  $(CD)$  يوازي  $(AB)$ .

إذن ميل المستقيم  $(CD)$  هو  $-1$ .

$$a = -1 \quad \text{إذن:}$$

- لنحدد  $b$ .

النقطة  $C$  تنتهي إلى المستقيم  $(CD)$ .

$$y_C = ax_C + b \quad \text{إذن:}$$


$$2 = -1 \times 2 + p \quad \text{إذن:}$$

$$2 = -2 + p \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{p=4} \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{(CD): y = -x + 4}$$

ومنه فإن:



. حساب المسافة  $AC$ . (2)

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} \\ &= \sqrt{(2 - (-2))^2 + (2 - 1)^2} \\ &= \sqrt{(2+2)^2 + (2-1)^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{17} \end{aligned}$$

. إحداثي النقطة  $E$  منتصف القطعة  $[AB]$ .

$$E\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

$$E\left(\frac{-2+1}{2}, \frac{1+(-2)}{2}\right)$$

$$\boxed{E\left(\frac{-1}{2}, \frac{-1}{2}\right)}$$

(4)

أ. لنبين أن النقطتين  $A$  و  $B$  تنتهيان إلى المستقيم الذي معادلته

$$y = -x - 1$$

$$-x_A - 1 = -(-2) - 1 = 2 - 1 = 1 = y_A \quad \text{إذن: } y_A = -x_A - 1$$

$$\text{إذن: } y_A = -x_A - 1$$

إذن: النقطة  $A$  تنتهي إلى المستقيم الذي معادلته  $y = -x - 1$ .

$$-x_B - 1 = -1 - 1 = -2 = y_B \quad \text{إذن: } y_B = -x_B - 1$$

$$\text{إذن: } y_B = -x_B - 1$$

إذن: النقطة  $B$  تنتهي إلى المستقيم الذي معادلته  $y = -x - 1$ .

ومنه فإن معادلة المستقيم  $(AB)$  هي  $y = -x - 1$ .

ب. نضع  $(\Delta): y = mx + p$

$$\boxed{[AB] \text{ واسط القطعة } (\Delta)}$$

$$\frac{HJ}{HB} = \frac{HI}{HD} = \frac{IJ}{BD} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

نجد أن:

$$\frac{JK}{AB} = \frac{1}{3} \quad \text{وأن:} \quad \frac{IK}{AD} = \frac{1}{3}$$

بنفس الطريقة نبين أن:

إذن من ما سبق يتبيّن أن المثلث  $IJK$  تصغير للمثلث  $ABD$  بنسبة  $\frac{1}{3}$ .

$$S_{IJK} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times S_{ABD}$$

إذن:

$$S_{IJK} = \frac{1}{9} \times 18$$

إذن:

$$\boxed{S_{IJK} = 2}$$

إذن:

### التمرين السادس:

ليكن  $x$  عدد المبيعات من الآلات لكي يكون العرض مربع. المصاريف الإجمالية الأسبوعية للعرض هي:  $1995 = 7 \times 285$

العرض مربع يعني أن: الأرباح أكبر من المصاريف:

$$40x > 1995$$

$$x > \frac{1995}{40}$$

يعني أن:

$$x > 49.87$$

أكبر عدد صحيح طبيعي أكبر من 49.87 هو 50.

لكي يكون العرض مربحاً خلال سبعة أيام يجب بيع 50 آلة على الأقل.

### التمرين الخامس:

.  $HB$  حساب (1)

$$\begin{cases} (HD) \perp (CD) \\ (HD) \perp (AD) \end{cases}$$

إذن:  $(HD) \perp (DB)$

بما أن:  $(DB) \subset (ADC)$  إذن:

إذن المثلث  $HDB$  قائم الزاوية في  $D$ .

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:

$$HB^2 = HD^2 + DB^2$$

$$HD^2 = 6^2 = 36$$

-

$$DB^2 = 6^2 = 36$$

- لحساب

المثلث  $ADB$  قائم الزاوية في  $A$ .

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:

$$DB^2 = AD^2 + AB^2$$

$$DB^2 = 6^2 + 6^2 = 36 + 36 = 72$$

إذن:

$$HB^2 = 36 + 72$$

$$HB^2 = 108$$

إذن:

$$\boxed{HB = \sqrt{108}}$$


إذن:

. (2) حساب  $V$  حجم الهرم  $HABD$

$$S_{ABD} = \frac{AD \times AB}{2} = \frac{6 \times 6}{2} = \frac{36}{2} = 18$$

$$V = \frac{1}{3} \times S_{ABD} \times DH = \frac{1}{3} \times 18 \times 6 = 36$$

. (3) حساب مساحة المثلث  $IJK$



ليكن  $(P)$  المستوى الموازي لل المستوى  $(ABD)$  والمارمن  $I$ .

$$\begin{cases} (P) \cap (DHB) = (IJ) \\ (ADB) \cap (DHB) = (BD) \end{cases}$$

لدينا:

$(P) // (ADB)$  وبما أن

فإن:  $(IJ) // (BD)$

بتطبيق مبرهنة طاليس المباشرة في المثلث  $DHB$

الموضوع**التمرين الرابع:**

- I. لتكن  $f$  الدالة التالية المعرفة كمتى يلي:  $f(x) = \frac{1}{3}x - 1$
1. احسب  $f(-3)$  و  $f(3)$ .
  2. أنشئ التمثيل البياني للدالة  $f$  في معلم متعمد منظم.
  3. حدد العدد الذي صورته بالدالة  $f$  هي  $-1$ .
- II. يبلغ ثمن تذكرة الدخول إلى منتزة 25 درهما. ليكن  $x$  عدد الوافدين على المنتزه و  $f(x)$  المدخل اليومي للمنتزه بالدرهم.
1. عبر عن  $f(x)$  بدلالة  $x$ .
  2. احسب عدد الوافدين على المنتزه في يوم بلغ مدخوله 1350 درهما.

**التمرين الخامس:**

في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد منظم، نعتبر النقطة:  $A(1, 0)$  و

$$C(0, 1) \text{ و } B(4, 3)$$

.1

أ. بين أن المثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $A$ .

ب. تحقق أن معادلة المستقيم  $(AB)$  هي:  $y = x - 1$

2. ليكن  $(\Delta)$  المستقيم الذي معادلته:  $y = -x + 4$


أ. تتحقق أن  $(\Delta)$  يمر من النقطة  $M$  منتصف  $[BC]$  وعمودي على المستقيم  $(AB)$ .

ب. استنتج إحداثي نقطة تقاطع المستقيمين  $(AB)$  و  $(\Delta)$ .

**التمرين السادس:**

هرم ارتفاعه  $[SA]$  وقاعدته المثلث  $ABC$  القائم الزاوية

$SC = 7\text{cm}$  و  $AB = 2\text{cm}$ . حيث  $A$  هي المتساوي الساقين في  $ABC$ .




$$SA = 3\sqrt{5}\text{cm}$$

2. ليكن  $V$  حجم الهرم  $SABCD$  بين أن  $V = 2\sqrt{5}\text{cm}^3$

**التمرين الأول:**

يعطينا المبيان التالي توزيع مبيعات سيارات على أيام شهر أبريل:



1. انقل على ورقة التحرير الجدول التالي ثم أتممه من خلال المبيان.

الميزة (عدد المبيعات)	الصيغ (عدد الأيام)
10	15

2. حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية.

3. حدد المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية.

**التمرين الثاني:**

نعتبر التعبير  $A = x^2 - 6x + 5$


$$1. \text{ تتحقق أن: } A = (x-3)^2 - 4$$

$$2. \text{ بين أن: } A = (x-1)(x-5)$$

$$3. \text{ استنتاج حلول المعادلة: } x^2 - 6x + 5 = 0$$

**التمرين الثالث:**

I. نعتبر الشكل التالي حيث  $ABCD$  مستطيل.



حدد قيمة العدد الحقيقي  $x$  إذا علمت أن مساحة المستطيل

$$36\text{cm}^2 \text{ تساوي } ABCD$$

II

$$1. \text{ حل المترابحة: } 3x + 12 < 36$$

$$2. \text{ حل النظمة: } \begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x + y = 2 \end{cases}$$

3. نعتبر مستوى مواز للمستوى  $(ABC)$ ، ويقطع الأضلاع  
في النقط  $A'$  و  $B'$  و  $C'$  على  $[SC]$  و  $[SB]$  و  $[SA]$

$$SA' = \frac{\sqrt{5}}{5} SA \text{ حيث التوالي (أنظر الشكل)} \\ \text{احسب } V \text{ حجم الهرم } SA'B'C'$$

### التمرين السابع:

.  $r = 3\text{cm}$  دائرة مركزها  $O$  وشعاعها  $(C)$

ليكن  $(D)$  المماس ل  $(C)$  في نقطة  $A$  من الدائرة، ولتكن  $B$  نقطة من  $(D)$  حيث  $AB = 4\text{cm}$

1. أنشئ نقطتين  $E$  و  $F$  صورتي  $A$  و  $B$  على التوالي  
بالإزاحة التي تحول  $O$  إلى  $B$ .

2. حدد صورة الدائرة  $(C)$  بهذه الإزاحة.

3. أ- بين أن الزاوية  $\hat{BEF}$  قائمة.

ب- احسب طول القطعة  $[BF]$ .

الحلالتمرين الثالث:I. لتكن  $S$  مساحة المستطيل  $ABCD$ .

$$S = 3 \times (x + 4)$$

بما أن:  $S = 36$ 

$$3 \times (x + 4) = 36 \quad \text{إذن:}$$

يعني أن:  $3x + 12 = 36$ يعني أن:  $3x = 36 - 12$ يعني أن:  $3x = 24$ 

$$x = \frac{24}{3} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\boxed{x = 8 \text{ cm}} \quad \text{إذن:}$$

II.

.1

$$3x + 12 < 36$$

يعني أن:  $3x + 12 < 36$ يعني أن:  $3x < 36 - 12$ يعني أن:  $3x < 24$ 

$$x < \frac{24}{3} \quad \text{يعني أن:}$$

$$x < 8 \quad \text{يعني أن:}$$

جميع الأعداد الحقيقة الأصغر قطعاً من 8 حل للمترابحة.  
2. لنحل النظمة بطريقة التالية الخطية.

- نجمع المعادلتين طرف بطرف، نحصل على المعادلة:

$$2x - y + 4x + y = 1 + 2$$

يعني أن:  $6x = 3$ 

$$x = \frac{3}{6} \quad \text{يعني أن:}$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{إذن:}$$

- نعرض  $x$  بـ  $\frac{1}{2}$  في المعادلة الثانية.

$$2 \times \frac{1}{2} - y = 1 \quad \text{إذن:}$$

يعني أن:  $1 - y = 1$ يعني أن:  $-y = 1 - 1$ يعني أن:  $-y = 0$ إذن:  $y = 0$ إذن حل النظمة هو الزوج:  $\left( \frac{1}{2}, 0 \right)$ التمرين الأول:

.1

الميزة (عدد المبيعات)	الحصيص (عدد الأيام)
35	30
2	8
30	20
25	6
20	10
15	4
4	14
4	30

2. الحصيص الإجمالي للمترابطة هو:  $30 \div 2 = 15$ بما أن نصف الحصيص الإجمالي هو:  $30 \div 2 = 15$ 

وأصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 15 هو 20.

قيمة الميزة الموافقة للحصيص المتراكم 20 هي 25.

إذن القيمة الوسطية هي 25.

3. نضع  $m$  المعدل الحسابي للمترابطة.

$$m = \frac{4 \times 15 + 10 \times 20 + 6 \times 25 + 8 \times 30 + 2 \times 35}{30} = \frac{720}{30}$$

إذن:  $m = 24$ 

إذن المعدل الحسابي للمترابطة هو 24.

التمرين الثاني:

$$A = x^2 - 6x + 5$$

.1

$$(x - 3)^2 - 4 = x^2 - 2 \times 3 \times x + 3^2 - 4$$

$$= x^2 - 6x + 9 - 4$$

$$= x^2 - 6x + 5$$

$$= A$$

$$A = (x - 3)^2 - 4 \quad \text{إذن:}$$

.2

$$A = (x - 3)^2 - 4$$

$$= (x - 3)^2 - 2^2$$

$$= (x - 3 + 2)(x - 3 - 2)$$

$$= (x - 1)(x - 5)$$

.3

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \quad \text{لدينا:}$$

$$(x - 1)(x - 5) = 0 \quad \text{يعني أن:}$$

$$x - 5 = 0 \quad x - 1 = 0 \quad \text{يعني أن:}$$

$$x = 5 \quad x = 1 \quad \text{يعني أن:}$$

إذن: المعادلة تقبل حللين هما 1 و 5.

$$AB = \sqrt{18}$$

إذن:  $.AC$  لنحدد المسافة ■  
لدينا:  $AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$

$$AC = \sqrt{(0-1)^2 + (1-0)^2}$$

إذن:  $AC = \sqrt{1^2 + 1^2}$   
إذن:  $AC = \sqrt{2}$   
إذن:  $.BC$  لنحدد المسافة ■

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

لدينا:  $BC = \sqrt{(0-4)^2 + (1-3)^2}$

$$BC = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2}$$

إذن:  $BC = \sqrt{16+4}$   
إذن:  $BC = \sqrt{20}$

$$AB^2 + AC^2 = 18 + 2 = 20 = BC^2$$

إذن حسب مبرهنة فيثاغورس العكسي فإن المثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $.A$

ب. لتحقق من أن إحداثي النقاطين  $A$  و  $B$  تحققان المعادلة  $y = x - 1$ .

$$y_A = x_A - 1 = 1 - 1 = 0 = y_A$$

$$y_B = x_B - 1 = 4 - 1 = 3 = y_B$$

$$\text{إذن معادلة المستقيم } (AB) \text{ هي: } y = x - 1$$

.2

أ.

- لنحدد إحداثي  $M$  منتصف  $[BC]$

$$M\left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}\right)$$

نعلم أن:

$$M\left(\frac{4+0}{2}, \frac{3+1}{2}\right)$$

إذن:

$$M(2, 2)$$

إذن:

- لنبين أن النقطة  $M$  تتنتمي إلى المستقيم  $(\Delta)$ :  $y = -x + 4$

$$\text{لدينا: } -x_M + 4 = -2 + 4 = 2 = y_M$$

$$\text{إذن: } y_M = -x_M + 4$$

إذن: النقطة  $M$  تتنتمي إلى المستقيم  $(\Delta)$

. أي أن المستقيم  $(\Delta)$  يمر من  $M$  منتصف  $[BC]$  ■  
لأن  $1 \times (-1) = -1$  (جاء الميلين  $= -1$ )  $\perp (AB)$

#### التمرين الرابع:

$$f(x) = \frac{1}{3}x - 1 \quad .1$$

$$f(-3) = \frac{1}{3} \times (-3) - 1$$

$$= -1 - 1$$


$$= -2$$

$$f(3) = \frac{1}{3} \times 3 - 1$$

$$= 1 - 1$$

$$= 0$$

2. التمثيل المباني للدالة  $f$  هو المستقيم المار من النقطتين  $B(-3, -2)$  و  $A(3, 0)$



3. مبنياً: التمثيل المباني للدالة  $f$ , أي  $(C_f)$  يمر من النقطة ذات الإحداثيات  $(0, -1)$ .

إذن العدد الذي صورته بالدالة  $f$  هي  $-1$  هو  $0$ .

II

$$f(x) = 25x \quad .1$$

المدخول بلغ في هذا اليوم 1350 درهم.

$$f(x) = 1350$$

$$25x = 1350$$

$$x = \frac{1350}{25}$$

$$x = 54$$

إذن عدد الوافدين على المتنزه في هذا اليوم هو 54.

#### التمرين الخامس:

.1

أ. لنحسب المسافات  $BC$  و  $AB$  و  $AC$  ■

■ لنحدد المسافة  $.AB$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

لدينا:

$$AB = \sqrt{(4-1)^2 + (3-0)^2}$$

إذن:

$$AB = \sqrt{(3)^2 + (3)^2}$$

إذن:

$$AB = \sqrt{9+9}$$

إذن:

$$AB = \sqrt{2 \times 9}$$

إذن:

$$\frac{SA'}{SA} = \frac{SC'}{SC} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

فإن: نفس الطريقة نبين أن:

$$\frac{SB'}{SB} = \frac{SC'}{SC} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{SA'}{SA} = \frac{SC'}{SC} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

و

ومنه فإن الهرم  $SA'B'C'$  تصغير للهرم  $SABC$  بنسبة  $\frac{\sqrt{5}}{5}$

$$V' = \left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^3 \times V$$

إذن:

$$V' = \frac{\sqrt{5}^3}{5^3} \times 2\sqrt{5} = \frac{\sqrt{5}^4}{5^3} \times 2$$

إذن:

$$V' = \frac{5^2}{5^3} \times 2 = \frac{2}{5} = 04$$


إذن:

$$\boxed{V' = 0.4 \text{ cm}^3}$$

إذن:

### التمرين السابع:

1. لتكن  $t$  الإزاحة التي تحول  $O$  إلى  $B$ .



2. صورة الدائرة  $(C)$  هي الدائرة  $(C')$  التي مرکزها  $B$  صورة وتمر من النقطة  $E$  صورة  $A$  الإزاحة  $t$ . (أنظر الشكل).

.3

أ. صورة الزاوية  $\hat{OAB}$  بـ  $t$  هي الزاوية  $\hat{B EF}$  إذن

$\hat{OAB} = \hat{B EF}$  (لأن الإزاحة تحافظ على قياس الزوايا). بما أن  $\hat{OAB} = 90^\circ$

$$\hat{B EF} = 90^\circ$$

فإن: ومنه فإن الزاوية  $\hat{B EF}$  قائمة.

ب.

$$BF = OB \quad \begin{cases} t_{OB}(O) = B \\ t_{OB}(B) = F \end{cases}$$

إذن:

باستعمال مبرهنة فيتاغورس المباشرة في المثلث  $AOB$  القائم الزاوية في  $A$ ، نجد أن:  $OB = 5$

$$\boxed{BF = 5 \text{ cm}}$$

إذن:

ب. المستقيم  $(\Delta)$  يمر من  $M$  منتصف  $[BC]$  ويوازي  $((AB) \perp (AC))$

إذن:  $(\Delta)$  يمر من  $N$  منتصف أي أن المستقيمين  $(AB)$  و  $(\Delta)$  يتقاطعان في النقطة  $N$ .

- لنحدد إحداثياتي النقطة  $N$ .

$$N\left(\frac{4+1}{2}, \frac{3+0}{2}\right) \quad \text{إذن: } N\left(\frac{x_B+x_A}{2}, \frac{y_B+y_A}{2}\right)$$

$$N\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) \quad \text{إذن:}$$

إذن المستقيمين  $(AB)$  و  $(\Delta)$  يتقاطعان في النقطة  $N\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$

### التمرين السادس:

$SABC$  .1 ارتفاع الهرم  $[SA]$

إذن:  $(SA) \perp (ABC)$

بما أن  $(AC) \subset (ABC)$

إذن:  $(SA) \perp (AC)$

إذن: المثلث  $SAC$  قائم الزاوية في  $A$ .

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:

$$SC^2 = SA^2 + AC^2$$

بما أن المثلث  $ABC$  متساوي الساقين في  $A$ .

إذن:  $AC = AB$

$$SC^2 = SA^2 + AB^2$$

$$SA^2 = SC^2 - AB^2$$

$$SA^2 = 7^2 - 2^2 = 49 - 4 = 45$$

$$SA = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$$

$$\boxed{SA = 3\sqrt{5} \text{ cm}}$$

2. حجم الهرم  $V$

$$V = \frac{1}{3} \times SA \times \frac{AB \times AC}{2}$$

$$V = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{5} \times \frac{2 \times 2}{2}$$

$$V = \sqrt{5} \times 2$$

$$\boxed{V = 2\sqrt{5}}$$

3. في المستوى  $(SAC)$  نعتبر المثلث  $SAC$

-  $(A'B'C')$  يقطع  $(SAC)$  حسب المستقيم

-  $(AC)$  يقطع  $(SAC)$  حسب المستقيم

بما أن المستويين  $(A'B'C')$  و  $(ABC)$  متوازيان.

فإن:  $(A'C)$  و  $(AC)$  متوازيان.

إذن: حسب مبرهنة طاليس المباشرة

الموضوع

(1)

(a) حدد مبانيها  $f(0)$  و  $f(2)$ .(b) حدد مبانيها العدد  $a$  بحيث  $1 \cdot f(a) = 1$ .(c) بين أن صيغة الدالة  $f$  هي  $f(x) = -x + 2$ .(2) تعتبر  $g$  الدالة الخطية المعرفة بـ  $g(x) = 2x$ .(a) انقل الشكل على ورقك ثم مثل مبانيها الدالة  $g$  في المعلم  $(O, I, J)$ .(b) حل مبانيها المعادلة  $f(x) = g(x)$ .التمرين الخامس:

يعطي الجدول التالي كشفاً لعدد الأهداف المسجلة من طرف فريق لكرة القدم خلال 30 مقابلة.

عدد الأهداف	عدد المقابلات
4	3
2	$2x$
1	$x$
0	11
5	5


(1) تحقق أن  $x = 4$ .

(2) احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية.

(3) احسب القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية.

التمرين السادس:

يمثل الشكل جانبه اسطوانة قائمة قطرها  $AB = 2\text{cm}$  وارتفاعها  $O \cdot h = 10\text{cm}$ .



(1)

(a) احسب  $V$  حجم الاسطوانة.(b) احسب المسافة  $AO'$ .(2) حدد شعاع قاعدة اسطوانة لها نفس الارتفاع  $h$  وحجمها  $V'$  بحيث

$$V' = \frac{V}{4}$$

التمرين الأول:(1) حل المعادلة  $7x + 5 = 3x + 2$ 

(2)

(a) عمل التعبير  $A = (3x+8)^2 - 16$  حيث(b) استنتج حل المعادلة  $(3x+8)^2 = 16$ (3) حل المترابحة  $3x + 5 \leq 2(x+3)$ 

(4) حل جبريا النظمة


$$\begin{cases} 6x + 7y = 8 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

التمرين الثاني: $ABC$  مثلث في المستوى.(1) أنشئ النقطة  $D$  بحيث  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ (2) أنشئ النقطة  $E$  صورة النقطة  $C$  بالإزاحة التي تحول  $B$  إلى  $A$ .

(3)

(a) بين أن المستقيم  $(BC)$  يوازي المستقيم  $(AE)$ .(b) احسب المسافة  $DE$  بدلالة المسافة  $AB$ . علل جوابك.التمرين الثالث:المستوى منسوب لمعلم متعمد منظم  $(O, I, J)$ نعتبر المستقيم  $(D)$  الذي معادلته  $y = 2x + 6$  والنقطتين  $J(0,1)$  و  $B(-4,3)$ .(1) حدد زوج إحداثي النقطة  $E$  منتصف القطعة  $[JB]$ .(2) بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم  $(JB)$  هي  $y = -\frac{1}{2}x + 1$ .

(3)

(a) تتحقق أن المستقيم  $(JB)$  والمستقيم  $(D)$  متعمدان.(b) بين أن المستقيم  $(D)$  واسط القطعة  $[JB]$ .التمرين الرابع:يمثل الشكل التمثيل المباني دالة تالية  $f$  في معلم  $(O, I, J)$ .

الحل

$$\begin{aligned} 3y &= 6 && \text{يعني أن:} \\ y &= \frac{6}{3} = 2 && \text{يعني أن:} \\ &- \text{ننوه بـ } y = 2 \text{ في المعادلة الأولى.} \\ 6x + 7 \times 2 &= 8 && \text{إذن:} \\ 6x + 14 &= 8 && \text{يعني أن:} \\ 6x &= 8 - 14 && \text{يعني أن:} \\ 6x &= -6 && \text{يعني أن:} \\ x &= -1 && \text{إذن:} \\ \text{حل النظمة هو الزوج: } &( -1, 2 ) \end{aligned}$$

التمرين الأول:

(1)

$$\begin{aligned} 7x + 5 &= 3x + 2 && \text{لدينا:} \\ 7x - 3x &= 2 - 5 && \text{يعني أن:} \\ 4x &= -3 && \text{يعني أن:} \\ x &= \frac{-3}{4} && \text{يعني أن:} \\ \text{المعادلة تقبل حل واحد هو } &\frac{-3}{4} \end{aligned}$$

(2)


(a)

$$\begin{aligned} A &= (3x+8)^2 - 16 \\ &= (3x+8)^2 - 4^2 \\ &= (3x+8-4)(3x+8+4) \\ &= (3x+4)(3x+12) \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} (3x+8)^2 &= 16 \\ (3x+8)^2 - 16 &= 0 && \text{يعني أن:} \\ (3x+4)(3x+12) &= 0 && \text{يعني أن:} \\ 3x+12 &= 0 \text{ أو } 3x+4 = 0 && \text{يعني أن:} \\ x &= \frac{12}{3} = 4 \text{ أو } x = \frac{-4}{3} && \text{يعني أن:} \\ \text{المعادلة تقبل حلين هما: } &\frac{-4}{3} \text{ و } 4. \end{aligned}$$

(3)



(2) أنظر الشكل السابق.  
(3)

(a) صورة  $C$  بالإزاحة التي تحول  $B$  إلى  $A$

يعني أن  $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$

يعني أن الرباعي  $ABCE$  متوازي الأضلاع.

إذن:  $(BC) // (AE)$

(b)

$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CE}$  لدينا:

( لأن الرباعي  $ABDC$  متوازي الأضلاع )  $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BA}$

وبما أن:  $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$

إذن:  $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA}$

إذن:  $\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB}$

إذن:  $\overrightarrow{DE} = -2\overrightarrow{AB}$

إذن:  $|DE = 2AB|$

جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 1 حلول  
للمراجحة.

(4) لحل النظمة بطريقة التالية الخطية.

$$\begin{cases} 6x + 7y = 8 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

- نضرب المعادلة الثانية في 2 - نحصل على النظمة التالية.

$$\begin{cases} 6x + 7y = 8 \\ -6x - 4y = -2 \end{cases}$$

نجمع المعادلتين طرف بطرف.

$$6x + 7y - 6x - 4y = 8 - 2$$

### التمرين الرابع:

(1)

$$f(2) = 0 \text{ و } f(0) = 2 \quad (\text{أ})$$

$$a = 1 \quad (\text{ب})$$

$$f(x) = sx + t \quad (\text{ج})$$

- لنحدد  $s$

$$s = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{0 - 2}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

- لنحدد  $t$

$$f(0) = 2 \quad \text{بما أن:}$$

$$2 = -1 \times 0 + t \quad \text{إذن:}$$

$$t = 2 \quad \text{إذن:}$$


$$\boxed{f(x) = -x + 2} \quad \text{ومنه فإن:}$$

$$g(x) = 2x \quad (2)$$

$$g(1) = 2 \times 1 = 2 = 2 \quad (\text{أ})$$

إذن: التمثيل المباني للدالة  $g$  هو المستقيم المار من أصل

المعلم (دالة خطية) والنقطة ذات الإحداثيات  $(1, 2)$ .



(b) مبنياً، حل المعادلة  $f(x) = g(x)$  هو أقصى نقطة تقاطع التمثيلين المبنيين للدالتي  $f$  و  $g$ .

أقصى نقطة تقاطع المستقيمين هو  $\frac{2}{3}$

إذن حل المعادلة هو  $\frac{2}{3}$ .

### التمرين الخامس:

(1) العدد الإجمالي للمقابلات هو: 30

$$5 + 11 + x + 2x + 2 = 30 \quad \text{إذن:}$$

$$3x + 18 = 30 \quad \text{يعني أن:}$$

$$3x = 12 \quad \text{يعني أن:}$$

$$x = \frac{12}{3} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\boxed{x = 4} \quad \text{إذن:}$$

### التمرين الثالث:

$$B(-4, 3) \text{ و } J(0, 1) \text{ و } (D): y = 2x + 6$$

$E$  منتصف القطعة  $[JB]$  (1)

$$E\left(\frac{x_J + x_B}{2}, \frac{y_J + y_B}{2}\right) \quad \text{إذن:}$$

$$E\left(\frac{0 + (-4)}{2}, \frac{1 + 3}{2}\right) \quad \text{إذن:}$$

$$E\left(\frac{-4}{2}, \frac{4}{2}\right) \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{E(-2, 2)} \quad \text{إذن:}$$

$$(JB): y = mx + p \quad (2)$$

- لنحدد  $m$ .

$$m = \frac{y_B - y_J}{x_B - x_A} = \frac{3 - 1}{-4} = \frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

- لنحدد  $p$ .

.  $J(0, 1)$  تتنمي إلى المستقيم

$$y_J = -\frac{1}{2}x_j + p \quad \text{إذن:}$$

$$1 = -\frac{1}{2} \times 0 + p \quad \text{يعني أن:}$$

$$p = 1 \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{(JB): y = -\frac{1}{2}x + 1} \quad \text{إذن:}$$

$$(JB): y = -\frac{1}{2}x + 1 \text{ و } (D): y = 2x + 6 \quad (3)$$

$$(a) \text{ بما أن: } -\frac{1}{2} \times 2 = \frac{-2}{2} = -1 \quad \text{ـ (جاء الميلين = -1)}$$

إذن:  $(D) \perp (JB)$

(b) بما أن  $(D) \perp (JB)$  يكفي أن نبين أن النقطة  $E$  منتصف

.  $E$  تتنمي إلى المستقيم  $[JB]$ .

$$2 \times x_E + 6 = 2 \times (-2) + 6 = -4 + 6 = 2 = y_E$$

أي أن:  $y_E = 2x_E + 6$

إذن:  $E$  تتنمي إلى المستقيم  $(D)$

أي أن المستقيم  $(D)$  يمر من منتصف القطعة  $[JB]$ .

إذن:  $(D)$  واسط القطعة  $[JB]$ .

$$4 \times r^2 = \left(\frac{2}{2}\right)^2 \quad \text{يعني أن:}$$

$$r^2 = \frac{1}{4} \quad \text{يعني أن:}$$

$$(r = \frac{1}{2}) \quad \text{عبارة عن مسافة (موجب))} \quad \text{إذن:}$$

يصبح الجدول على الشكل التالي:

قيمة الميزة	الحصيص
4	3
2	8

(2) ليكن  $m$  المعدل الحسابي للمتسلسلة.

$$m = \frac{5 \times 0 + 11 \times 1 + 4 \times 2 + 8 \times 3 + 2 \times 4}{30}$$

$$m = \frac{45}{30} \quad \text{إذن:}$$

$$m = 1,5 \quad \text{أي أن:}$$

إذن المعدل الحسابي للمتسلسلة هو 1,5

(3) الحصيص الإجمالي للمتسلسلة هو: 30

بما أن نصف الحصيص الإجمالي هو:  $30 \div 2 = 15$

وأصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 15 هو 16.

قيمة الميزة الموافقة للحصيص المتراكم 16 هي 1.

إذن القيمة الوسطية هي 1.

### التمرين السادس:

(1)

$V$  حجم الأسطوانة. (a)

$$V = \pi \times \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \times h$$

$$V = \pi \times \left(\frac{2}{2}\right)^2 \times 10 \quad \text{إذن:}$$

$$V = 31,4 \text{ cm}^3 \quad \text{إذن:}$$

(b) حساب المسافة ' $AO'$ .

المثلث ' $AOO'$  قائم الزاوية في  $O$ .

إذن حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة فإن:

$$AO'^2 = AO^2 + OO'^2$$

إذن:

$$AO'^2 = 1^2 + 10^2 \quad \text{إذن:}$$

$$AO'^2 = 101 \quad \text{إذن:}$$

$$AO' = \sqrt{101} \quad \text{إذن:}$$

(2) ليكن  $r$  شعاع الأسطوانة.

$$V' = \pi \times \left(\frac{r}{2}\right)^2 \times h \quad \text{إذن:}$$

$$\pi \times r^2 \times h = \frac{\pi \times \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \times h}{4} \quad \text{إذن: } V' = \frac{V}{4}$$

$$4 \times \pi \times r^2 \times h = \pi \times \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \times h \quad \text{يعني أن:}$$

$$4 \times r^2 = \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \quad \text{يعني أن:}$$

الموضوع

ب- تحقق من أن النقطة  $C\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$  هي نقطة تقاطع المستقيمين  $(\Delta)$  و  $(\Delta')$ .

- 4) لتكن  $t$  الإزاحة التي تحول النقطة  $C$  إلى النقطة  $B$  و  $E$  صورة النقطة  $A$  بالإزاحة  $t$ .
- أ. حدد إحداثي النقطة  $E$ .
  - ب. بين أن المثلث  $EBC$  قائم الزاوية ومتساوي الساقين في  $B$ .
  - ج. استنتج طبيعة الرباعي  $AEBC$ .

التمرين الرابع:

أ. تتحقق من أن:  $2x^2 - 3x - 2 = (2x+1)(x-2)$

ب- استنتج حلول المعادلة:  $2x^2 - 3x - 2 = 0$

2) حل المترابحة:  $\frac{x-1}{3} - \frac{1}{2} < \frac{x}{2}$

3) أ- حل النظمية التالية:


$$\begin{cases} x + 2y = 17 \\ x + y = 12 \end{cases}$$

ب- يتوفر أحمد على مبلغ قيمته 85 درهما عبارة عن 12 قطعة نقدية. النوع الأول من فئة 5 دراهم والنوع الثاني من فئة 10 دراهم. ما هو عدد القطع النقدية من كل فئة؟

التمرين الخامس:

نعتبر المكعب  $ABCDEFGH$  بحيث مساحة المثلث  $HEF$  هي

$2\text{cm}^2$ .




1) بين أن  $EF = 2\text{cm}$ .

2) أ- احسب حجم الهرم  $AEFGH$ .

ب- إذا قمنا بتكبير الهرم  $AEFGH$  بنسبة 3، فما هو حجم الهرم المحصل عليه؟

التمرين الأول:

لتكن  $f$  الدالة التالية التي تمثلها المبيانى المستقيم  $(D)$  في المعلم المتعامد المنظم  $(O,I,J)$ . ( انظر الشكل )



1) أ- حدد مبيانيا  $f(0)$  و  $f(1)$ .

ب- بين أن:  $f(x) = 2x + 1$ .

2) لتكن  $g$  الدالة الخطية بحيث:  $g(x) = 2x$  و  $(\Delta)$  تمثلها المبيانى في المعلم  $(O,I,J)$ .

أ- بين أن المستقيمين  $(D)$  و  $(\Delta)$  متوازيان.

ب- مثل المستقيم  $(\Delta)$  في نفس المعلم.

التمرين الثاني:

حصل 20 تلميذا في قسم من الثالثة إعدادي في أحد فروض مادة الرياضيات على النتائج التالية:

- 8 - 15 - 10 - 3 - 11 - 15 - 9 - 11 - 15

9 - 11 - 11 - 9 - 3 - 11 - 8 - 10 - 9 - 8

1) أعط جدول للحصصيات.

2) بين أن المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية هو 10,05

3) مثل مبيانيا هذه المتسلسلة بمخطط بالعصبي.

التمرين الثالث:

نعتبر في المستوى المنسوب لإلى معلم متعامد منظم  $(O,I,J)$  النقطتين

$A(2,2)$  و  $B(2,1)$  والمستقيم  $(\Delta)$  الذي معادلته  $y = -x + 4$ .

1) تحقق من أن النقطة  $B(2,2)$  تتبع إلى المستقيم  $(\Delta)$ .

2) أنشئ المستقيم  $(\Delta)$ .

3) أ- حدد معادلة مختصرة للمستقيم  $(\Delta)$  العمودي على  $(\Delta)$ .

والمار من النقطة  $A(2,1)$ .

الحلالتمرين الثاني:

(1)

15	11	10	9	8	3	الميزة
4	5	2	4	3	2	الحصيص

(2) ليكن  $m$  المعدل الحسابي للمتسسلة

$$m = \frac{2 \times 3 + 3 \times 8 + 4 \times 9 + 2 \times 10 + 5 \times 11 + 4 \times 15}{20}$$


نعلم أن:

$$m = \frac{201}{20} = 10.05$$

إذن:

إذن: المعدل الحسابي للمتسسلة هو 10.05

(3)


التمرين الثالث:

(Δ):  $y = -x + 4$  (1)

$-x_B + 4 = -2 + 4 = 2 = y_B$  بما أن:

إذن إحداثي النقطة  $B$  تحقق معادلة المستقيم  $(\Delta)$ .إذن النقطة  $B(2, 2)$  تتنمي إلى المستقيم  $(\Delta)$ .(2) بنفس طريقة السؤال 1 نبين أن النقطة  $M(0, 4)$  تتنمي إلى المستقيم

(Δ).

إذن  $(\Delta)$  هو المستقيم المار من النقطتين  $B(2, 2)$  و  $M(0, 4)$ .التمرين الأول:(1) أ- النقطة التي تتنمي إلى المستقيم  $(D)$  وأرتوبها 1، أقصولها هو 3 . إذن  $f(1) = 3$ النقطة  $J(0.1)$  تتنمي إلى المستقيم  $(D)$ ؛ إذن  $f(0.1) = 1$ ب-  $f$  دالة تالية لأن تمثيلها المباني  $(D)$  لا يمر من أصل المعلم.نضع  $f(x) = ax + b$ .لنحدد  $a$ .

$$a = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}$$

$$a = \frac{3 - 1}{1}$$

إذن:

$$a = 2$$

لنحدد  $b$ .

$$f(1) = 3 \quad \text{بما أن:}$$

$$3 = 2 \times 1 + b \quad \text{إذن:}$$


$$b = 3 - 2 \quad \text{إذن:}$$

$$b = 1 \quad \text{إذن:}$$

ومنه فإن:

$$f(x) = 2x + 1 \quad g(x) = 2x \quad (2)$$

دالة خطية بحيث:

أ- لدينا:  $(D'): y = 2x + 1$  (D):  $y = 2x + 1$  .إذن للمستقيمين  $(D)$  و  $(D')$  نفس الميل "2"ومنه فإن المستقيمين  $(D)$  و  $(D')$  متوازيان.ب-  $(D')$  هو المستقيم المار من أصل المعلم ( لأن  $g$  دالة خطية )ويوازي المستقيم  $(D)$ .

بـ- لنحسب المسافات التالية:  $EB$  و  $EC$  و  $BC$ .

لنحدد المسافة  $EB$  ■

$$EB = \sqrt{(x_B - x_E)^2 + (y_B - y_E)^2}$$

$$EB = \sqrt{\left(2 - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2}$$

$$EB = \sqrt{\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$EB = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}$$

$$EB = \sqrt{\frac{2}{4}}$$

لنحدد المسافة  $EC$  ■

$$EC = \sqrt{(x_C - x_E)^2 + (y_C - y_E)^2}$$

$$EC = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right)^2}$$

$$EC = \sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2}$$

$$EC = 1$$

لنحدد المسافة  $BC$  ■

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$$BC = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - 2\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - 2\right)^2}$$

$$BC = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{-1}{2}\right)^2}$$

$$BC = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}$$

$$BC = \sqrt{\frac{2}{4}}$$

بما أن :  $EB = BC = \sqrt{\frac{2}{4}}$  فإن المثلث  $EBC$  متساوي الساقين في  $B$ .

$$BC^2 + EB^2 = \frac{2}{4} + \frac{2}{4} = \frac{4}{4} = 1 = EC^2$$

وبما أن:  $EB = BC$  فإن حسب مبرهنة فيتاغورس العكسية فإن المثلث  $EBC$  قائم الزاوية في  $B$ .

جـ-  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$  متوازي الأضلاع لأن  $AEBC$

$$EB = AC \quad AE = BC$$

$$\text{إذن: } EB = BC$$

$$\text{بما أن (السؤال 4-ب-) } AE = EB = BC = AC$$

$$\text{إذن: } AE = EB = BC = AC$$

(3)

أـ- نضع  $(\Delta'): y = mx + p$

- لنحدد قيمة  $m$  ميل المستقيم  $(\Delta')$ .

$m \times (-1) = -1$  إذن:  $(\Delta')$  عمودي على  $(\Delta)$ .

$$\boxed{m=1}$$

- لنحدد قيمة  $p$  الأرتبوب عند الأصل.

النقطة  $A(2,1)$  تنتهي إلى المستقيم  $(\Delta')$

$$\text{إذن: } y_A = 1 \times x_A + p$$

$$\text{إذن: } 1 = 1 \times 2 + p$$

$$\boxed{p = -1}$$

$$\boxed{(\Delta'): y = x - 1}$$

بـ- لنبين أن النقطة  $C\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$  تنتهي إلى  $(\Delta)$  و  $(\Delta')$ .

$$-x_C + 4 = -\frac{5}{2} + 4 = \frac{-5+8}{2} = \frac{3}{2} = y_C$$

إذن:  $C$  تنتهي إلى المستقيم  $(\Delta)$ .

$$x_C - 1 = \frac{5}{2} - 1 = \frac{5-2}{2} = \frac{3}{2} = y_C$$

إذن:  $C$  تنتهي إلى المستقيم  $(\Delta')$ .

ومنه فإن النقطة  $C\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$  في نقطة تقاطع المستقيمين  $(\Delta)$  و  $(\Delta')$ .

$$\cdot t_{\overrightarrow{CB}}(E) = A \quad \overrightarrow{CB} \quad \text{الإزاحة ذات المتجهة } t$$

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{EA} \quad \text{يعني أن: } t_{\overrightarrow{CB}}(E) = A$$

بما أن:  $\overrightarrow{CB}(x_B - x_C, y_B - y_C)$  و  $\overrightarrow{EA}(x_A - x_E, y_A - y_E)$

$$\overrightarrow{CB}\left(2 - \frac{5}{2}, 2 - \frac{3}{2}\right) \text{ و } \overrightarrow{EA}(2 - x_E, 1 - y_E)$$

$$\begin{cases} 2 - \frac{5}{2} = 2 - x_E \\ 2 - \frac{3}{2} = 1 - y_E \end{cases} \quad \text{يعني أن: } \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{EA}$$

$$\begin{cases} x_E = \frac{5}{2} \\ y_E = -1 + \frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{إذن: } \begin{cases} -x_E = 2 - \frac{5}{2} - 2 \\ -y_E = 2 - \frac{3}{2} - 1 \end{cases} \quad \text{يعني أن: }$$

$$\begin{cases} x_E = \frac{5}{2} \\ y_E = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{إذن: }$$

$$\boxed{E\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)}$$

- ب-
- ليكن  $x$  عدد القطع النقدية من فئة 5 دراهم.
  - ليكن  $y$  عدد القطع النقدية من فئة 10 دراهم.
- عدد القطع النقدية من الفتتىن هو 12 .

$$\text{إذن: } x + y = 12$$

المبلغ الإجمالي هو 85 درهم.

$$\text{إذن: } 5x + 10y = 85$$

$$\begin{cases} 5x + 10y = 85 \\ x + y = 12 \end{cases}$$

نحصل على المظمة التالية:

$$\frac{1}{5} \text{ نضرب طرفي المعادلة الثانية في } 5$$

$$\begin{cases} x + 2y = 17 \\ x + y = 12 \end{cases}$$

نحصل على النظمة:


حل النظمة هو الزوج (7,5) (السؤال أ-)

إذن:

عدد القطع النقدية من فئة 5 دراهم هو 7 .

عدد القطع النقدية من فئة 10 دراهم هو 5 .

### التمرين الخامس:



لأن  $\angle HEF = 90^\circ$  (1)  $\angle HEG = 90^\circ$  (2)  $\angle FEG = 90^\circ$  (3)  $\angle FEG = 90^\circ$  (4)

لأن  $\angle HEG = \angle FEG$  (5)

$$S = \frac{EH \times EF}{2}$$

بما أن المثلث  $HEF$  ومتتساوي الساقين في  $E$

$$EH = EF \quad \text{إذن:}$$

$$S = \frac{EF^2}{2} \quad \text{منه:}$$

نعلم أن:  $S = 2cm^2$  (المعطيات)

$$\frac{EF^2}{2} = 2 \quad \text{إذن:}$$

إذن:  $EF = 2\sqrt{2}$  (المسافة تكون دائمًا موجبة)

$$\boxed{EF = 2\sqrt{2}}$$

بما أن الزاوية  $\hat{B}$  زاوية قائمة  
إذن الرباعي  $AEBE$  مربع.

### التمرين الرابع:

أ- (1)

$$(2x+1)(x-2) = 2x \times x + 1 \times x - 2x \times 2 - 2 \times 1$$

$$= 2x^2 + x - 4x - 2$$

$$= 2x^2 - 3x - 2$$

$$2x^2 - 3x - 2 = (2x+1)(x-2) \quad \text{إذن}$$

$$2x^2 - 3x - 2 = 0 \quad \text{لدينا}$$

$$(2x+1)(x-2) = 0 \quad \text{يعني أن:}$$

$$x-2=0 \quad \text{أو} \quad 2x+1=0 \quad \text{يعني أن:}$$

$$x=2 \quad \text{أو} \quad x=\frac{-1}{2} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\text{إذن المعادلة تقبل حللين هما: } \frac{-1}{2} \text{ و } 2 .$$

$$\frac{x-1}{3} - \frac{1}{2} < \frac{x}{2} \quad \text{لدينا: (2)}$$

$$\frac{2(x-1)}{3 \times 2} - \frac{1 \times 3}{2 \times 3} < \frac{3x}{2 \times 3} \quad \text{يعني أن:}$$

$$\frac{2x-2}{6} - \frac{3}{6} < \frac{3x}{6} \quad \text{يعني أن:}$$

$$2x-2-3 < 3x \quad \text{يعني أن:}$$

$$2x-5 < 3x \quad \text{يعني أن:}$$

$$2x-3x < 5 \quad \text{يعني أن:}$$

$$-x < 5 \quad \text{يعني أن:}$$

$$x > -5 \quad \text{يعني أن:}$$

إذن: جميع الأعداد الحقيقة الأكبر قطعاً من 5 - حلول للمراجحة.

أ- (3)

لأن  $x+2y=17$  (1)  
 $x+y=12$  (2)

نضرب المعادلة الثانية في (-1)

$$\begin{cases} x+2y=17 \\ -x-y=-12 \end{cases}$$

نحصل على النظمة:

نجمع المعادلتين طرف بطرف نحصل على المعادلة التالية:

$$x+2y-x-y=17-12$$

$$\boxed{y=5}$$

يعني أن:  $y=5$

$$x+y=12 \quad \text{نعرض } y \text{ بـ 5 في المعادلة}$$

$$\boxed{x+5=12}$$

إذن:  $x=7$

$$\boxed{x=7}$$

إذن:  $x=7$

حل النظمة هو الزوج (7,5)

. أ- ليكن  $v$  حجم الهرم  $AEGH$  . (2)

$$\begin{cases} (AE) \perp (EH) \\ (AE) \perp (EF) \end{cases} \text{ بما أن:}$$

$$(AE) \perp (EFH) \quad \text{إذن:}$$

إذن: إرتفاع الهرم  $AE$  هو  $AEGH$  وقاعدته هي المربع

$EF^2$  الذي مساحته هي  $EFGH$

$$v = \frac{1}{3} \times EA \times EF^2 \quad \text{إذن:}$$

$$v = \frac{1}{3} \times 2 \times 2^2 \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{v = \frac{8}{3} cm^3} \quad \text{إذن:}$$

ب- ليكن  $V$  حجم الهرم بعد التكبير بنسبة 3.

$$V = 3^3 \times v \quad \text{إذن:}$$

$$V = 3^3 \times \frac{8}{3} \quad \text{إذن:}$$

$$V = 3^2 \times 8 \quad \text{إذن:}$$

$$\boxed{V = 72 cm^3} \quad \text{إذن:}$$


الموضوعالتمرين الأول:الجزء A:

$$\begin{cases} -x + y = 3 \\ -3x + y = -1 \end{cases}$$


لتكن  $(S)$  النظمة

(1) هل الزوج  $(1,1)$  حل للنظمة  $(S)$ ? (علل جوابك)(2) حل النظمة  $(S)$ الجزء B:

$$(1) \text{ نعتبر الدالة الخطية } f \text{ حيث } f(x) = \frac{1}{3}x.$$

أ. حدد صورة العدد 6 بالدالة  $f$ .ب. حدد العدد الذي صورته، بالدالة  $f$ ، هي 1.ج. ما هو معامل الدالة  $f$ ?(2) يمثل المستقيم  $(D)$  مبيان دالة تالية  $g$  في معلم متعمد منظم $(O, I, J)$ .أ. حدد مبيانيا  $g(-3)$  و  $g(-1)$ .ب. بين أن  $g(x) = 2x + 5$ .التمرين الثاني:في المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم  $(O, I, J)$  نعتبر نقطتين $B(0, 3)$  و  $A(2, 0)$ 

(1)

أ. أنشئ النقطتين  $A$  و  $B$ .ب. احسب المسافة  $AB$ .(2) نعتبر النقطة  $O'(3, 3)$  والنقاطين  $A'$  و  $B'$  صورتي  $A$  و  $B$ على التوالي بالإزاحة التي تحول  $O$  إلى  $O'$ .أ. حدد، بدون أي حساب، المسافة  $A'B$ . (علل جوابك)ب. ما هو قياس الزاوية  $A'\widehat{O'}B$ ? (علل جوابك)ج. حدد احداثي المتجهة  $\overrightarrow{A'B}$ .(1) أ. احسب حجم الهرم  $SABCD$ .ب. تحقق أن  $AC = 4\sqrt{2}$ .

(1)

(2) نعتبر المستوى ( $NPR$ ) المواز للمستوى ( $BCD$ ) والمار من

$$\text{النقطة } M \text{ بحيث } SM = \frac{1}{3} SA ; \text{ فنحصل على الهرم}$$


$.SABCD$  كتصغير للهرم  $SMNPR$

$$\text{أ. بين أن } MN = \frac{1}{3} AB$$

ب. استنتج حجم الهرم  $.SMNPR$

### التمرين الخامس:

يمثل المخطط متسلسلة إحصائية ترصد عدد المنخرطين بأحد نوادي السباحة حسب أعمارهم.



(1) أتم الجدول التالي:

الأعمار	عدد المنخرطين
15	
14	5
12	
10	

(2) ما هو العدد الإجمالي للمنخرطين في هذا النادي؟

(3) تحقق أن متوسط العمر (أي المعدل الحسابي للمتسلسلة) هو

.13

(4) تم تسجيل 4 منخرطين جدد، لهم نفس السن (نرمز له بـ  $x$ )، فازداد متوسط العمر بنصف سنة بالضبط.

أ. بين أن  $4x + 260 = 324$

ب. حدد سن المنخرطين الجدد.